

វិសមភាព

វិ ស ម ភា ព

360°

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិសមភាព

$$\sum_{i=1}^n a_i \geq n \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}$$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i\right)$$

$$\frac{b}{a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$



Augustin Louis Cauchy

ចាក់គ្រឹះលើផ្នែកវិសមភាព
មេរៀន លំហាត់ និង គន្លឹះ

រៀបរៀងដោយ ជា ពិសិដ្ឋ

អារម្ភកថា

វិសមភាពជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងគណិតវិទ្យា ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ទេ ដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននៃវិសមភាពបានធ្វើឲ្យលំហាត់ប្រភេទនេះលេចរូបរាងឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានាពិសេសនោះ គឺ ការប្រឡងសិស្សពូកែកម្រិតជាតិ និង អន្តរជាតិជាដើម ។ ហេតុនេះ ការយល់ដឹងពីវិសមភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្អូនៗដែលចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែមួយរូប ។

សៀវភៅវិសមភាព 360° នេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងសម្រាប់ផ្តល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះលើផ្នែកវិសមភាពទៅដល់មិត្តអ្នកអាន ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងជាលក្ខណៈមេរៀននៃវិសមភាពដែលក្នុងនោះខ្ញុំបាទបានរៀបរៀងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិសមភាពជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលពេញនិយមនៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងដូចជាវិសមភាពនៃមធ្យម (QM-AM-GM-HM), វិសមភាព Cauchy-Schwarz, វិសមភាពនៃតម្រៀប (Rearrangement), វិសមភាព Jensen និង វិសមភាពជាច្រើនទៀត ។ លើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំបាទបានបញ្ចូលនូវតិចនិចមួយចំនួនដូចជា ការតាងបែបពីជគណិត ការតាងបែបត្រីកោណមាត្រ និង ការតាងបែប Ravi ជាដើម ។

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីលំហាត់មួយ រឺ ក៏សៀវភៅមួយការសង្កេតលើលក្ខណៈទូទៅរបស់លំហាត់ទាំងនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ។ ការយល់ពីលក្ខណៈទូទៅនេះប្រៀបដូចជាគន្លឹះ រឺ កូនសោរមួយដែលជួយអ្នកឲ្យចាក់សោរបើកទ្វារចេញទៅរកភាពរីកចម្រើន ។

ទោះបីជាមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងណាក៏ដោយកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាមួយចំនួនប្រាកដជាទើតមានឡើង ។ ហេតុនេះ យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនរាល់មតិវិះគន់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សាទាំងអស់ដើម្បីកែលំអឲ្យសៀវភៅមួយក្បាលនេះក្លាយជាសៀវភៅវិសមភាពដ៏ល្អប្រសើរ ។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤
រៀបរៀងដោយ ជា ពិសិដ្ឋ

មាតិកា

1. ការរៀនចំនួនវិជ្ជមាន.....	ទំព័រ ១
2. វិសមភាពងាយ.....	ទំព័រ ១០
3. ទម្រង់ Engel នៃវិសមភាព Cauchy-Schwarz.....	ទំព័រ ១៦
4. វិសមភាពនៃមធ្យម.....	ទំព័រ ២៦
5. វិសមភាព Cauchy-Schwarz.....	ទំព័រ ៥៣
6. វិសមភាពនៃតម្រៀប.....	ទំព័រ ៥៩
7. វិសមភាព Jensen.....	ទំព័រ ៧៤
8. វិសមភាពស៊ីមេទ្រី.....	ទំព័រ ៩០
9. វិធីសាស្ត្រជំនួស.....	ទំព័រ ៩៨
10. ភាពអ៊ីម៉ូសែន.....	ទំព័រ ១៣២

ការដោះស្រាយបំណុលវិសមភាព

ចំពោះ x ជាចំនួនពិត គេបាន $x^2 \geq 0$ សមភាព លុះត្រាតែ $x = 0$ ។

វិសមភាពត្រីកោណ (Triangle Inequality)

បើ a, b ជាចំនួនពិត គេបាន $|a + b| \leq |a| + |b|$ សមភាពពេល $ab \geq 0$ ។

សម្រាយ

ដើម្បីបង្ហាញថាសំណើខាងលើពិតយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } |a + b|^2 &= (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &\leq (|a| + |b|)^2 \end{aligned}$$

សមភាពកើតឡើងពេល $|ab| = ab \Leftrightarrow ab \geq 0$ រឺ a, b មានសញ្ញាដូចគ្នា ។

ទម្រង់ទូទៅនៃវិសមភាពត្រីកោណ

ចំពោះ x_1, x_2, \dots, x_n ជាចំនួនពិត យើងបាន

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \text{ សមភាពកើតឡើងពេល}$$

$x_i, i = \overline{1, n}$ មានសញ្ញាដូចគ្នា ។



លំហាត់ ១

គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a + d = b + c$ ។

បង្ហាញថា $(a-b)(c-d) + (a-c)(b-d) + (d-a)(b-c) \geq 0$ ។

(Czech and Slovak Republics, 2004)

ចម្លើយ

យើងមាន $a + d = b + c \Rightarrow a - b = c - d$

គេបាន $(a-b)(c-d) + (a-c)(b-d) + (d-a)(b-c)$

$$= ac - ad - bc + bd + ab - ad - bc + cd + bd - cd - ab + ac$$

$$= 2ac - 2ad - 2bc + 2bd = 2a(c-d) - 2b(c-d)$$

$$= 2(a-b)(c-d) = 2(a-b)^2 \geq 0$$

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $a = b = c = d$

លំហាត់ ២

គេឲ្យ $f(a, b, c, d) = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-a)^2$ ។

ចំពោះ $a < b < c < d$ បង្ហាញថា

$$f(a, c, b, d) > f(a, b, c, d) > f(a, b, d, c) \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

យើងមាន $f(a, c, b, d) - f(a, b, c, d)$

$$= (a-c)^2 - (a-b)^2 + (b-d)^2 - (c-d)^2$$

$$= (b-c)(2a-b-c) + (b-c)(b+c-2d)$$

$$= 2(b-c)(a-d) > 0$$

គេបាន $f(a,c,b,d) > f(a,b,c,d)$ (1)

$$\begin{aligned} & \text{ម្យ៉ាងទៀត } f(a,b,c,d) - f(a,b,d,c) \\ &= (b-c)^2 - (b-d)^2 + (d-a)^2 - (c-a)^2 \\ &= (d-c)(2b-c-d) + (d-c)(c+d-2a) \\ &= 2(d-c)(b-a) > 0 \end{aligned}$$

គេបាន $f(a,b,c,d) > f(a,b,d,c)$ (2)

តាម (1),(2) យើងបាន $f(a,c,b,d) > f(a,b,c,d) > f(a,b,d,c)$

សំណួរ ៣

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $abc = 1$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} + \frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} + \frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} \leq 1 \quad \text{។}$$

(IMO Shortlist, 1996)

ចម្លើយ

យើងមាន $(a^3 - b^3)(a^2 - b^2) \geq 0 \Rightarrow a^5 + b^5 \geq a^2b^2(a+b)$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } \frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} &\leq \frac{ab}{a^2b^2(a+b) + ab} = \frac{abc^2}{a^2b^2c^2(a+b) + abc^2} \\ &= \frac{c}{a+b+c} \quad \text{ព្រោះ } abc = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ស្រាយដូចគ្នា យើងបាន } \frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} &\leq \frac{a}{a+b+c} \\ \frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} &\leq \frac{b}{a+b+c} \end{aligned}$$

ហេតុនេះ $\frac{ab}{a^5+b^5+ab} + \frac{bc}{b^5+c^5+bc} + \frac{ca}{c^5+a^5+ca} \leq \frac{a+b+c}{a+b+c} = 1$

លំហាត់ ៤

បង្ហាញថា $|a|+|b|+|c|-|a+b|-|b+c|-|c+a|+|a+b+c| \geq 0$ (*) ។

ចម្លើយ

បើ a, b រឺ $c = 0$ គេបាន (*) ពិត

ក្រៅពីនេះ WLOG¹ សន្មតថា $|a| \geq |b| \geq |c| > 0$ គេបាន $\left| \frac{b}{a} \right| \leq 1, \left| \frac{c}{a} \right| \leq 1$

យើងបាន (*) សមមូល

$$1 + \left| \frac{b}{a} \right| + \left| \frac{c}{a} \right| - \left| 1 + \frac{b}{a} \right| - \left| \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| - \left| 1 + \frac{c}{a} \right| + \left| 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 1 + \left| \frac{b}{a} \right| + \left| \frac{c}{a} \right| - 1 - \frac{b}{a} - \left| \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| - 1 - \frac{c}{a} + \left| 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{b}{a} \right| + \left| \frac{c}{a} \right| - \left| \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| - \left(1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right) + \left| 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| \geq 0 \text{ ពិត}$$

ព្រោះ $\left| \frac{b}{a} \right| + \left| \frac{c}{a} \right| \geq \left| \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right|, \left| 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \right| \geq 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a}$

លំហាត់ ៥

រកតម្លៃតូចបំផុតនៃ $\sum_{i=1}^{100} |x-i|$ ចំពោះ x ជាចំនួនពិត ។

ចម្លើយ

ចំពោះ $k = \overline{1,50}$ យើងបាន $|x-k| + |x-(101-k)| \geq |101-2k|$

¹ Without Loss of Generality

ព្រោះ $|a| + |b| \geq |a - b|$

សមភាពពេល $(x - k)[x - (101 - k)] \leq 0 \Leftrightarrow x \in [k, 101 - k]$

គេបាន $|x - 1| + |x - 100| \geq 99$

$|x - 2| + |x - 99| \geq 97$

.....

$|x - 50| + |x - 51| \geq 1$

បូកអង្គ និង អង្គគេបាន $\sum_{i=1}^{100} |x - i| \geq 1 + 3 + \dots + 97 + 99 = 50^2 = 2500$

សមភាពពេល $x \in \bigcap_{k=1}^{50} [k, 101 - k] = [50, 51]$

ដូចនេះ តម្លៃតូចបំផុតនៃ $\sum_{i=1}^{100} |x - i|$ គឺ 2500 សមភាពលុះត្រាតែ $x \in [50, 51]$

លំហាត់ ៦

ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{4x^2}{(1 - \sqrt{1 + 2x})^2} < 2x + 9$ ។

(IMO, 1960)

ចម្លើយ

$\frac{4x^2}{(1 - \sqrt{1 + 2x})^2} < 2x + 9$ មានន័យ កាលណា $\begin{cases} 1 + 2x \geq 0 \\ 1 - \sqrt{1 + 2x} \neq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right) \cup (0, +\infty)$

យើងមាន $\frac{4x^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2} < 2x+9$

$$\Leftrightarrow \frac{4x^2(1+\sqrt{1+2x})^2}{(1-\sqrt{1+2x})^2(1+\sqrt{1+2x})^2} < 2x+9$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x^2(1+\sqrt{1+2x})^2}{(1-1-2x)^2} < 2x+9 \Leftrightarrow (1+\sqrt{1+2x})^2 < 2x+9$$

$$\Leftrightarrow 1+2\sqrt{1+2x}+1+2x < 2x+9 \Leftrightarrow \sqrt{1+2x} < \frac{7}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1+2x < \frac{49}{4} \Leftrightarrow x < \frac{45}{8}$$

ដូចនេះ $x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{45}{8}\right)$

លំហាត់ ៧

បង្ហាញថា $\{\sqrt{4n^2+n}\} < \frac{1}{4}, \forall n \in \mathbb{IN}$ ។ $\{x\}$ តាងឲ្យផ្នែកទសភាគនៃ x ។

ចម្លើយ

យើងមាន $4n^2 < 4n^2+n < 4n^2+4n+1$

$$\Rightarrow 2n < \sqrt{4n^2+n} < 2n+1$$

គេបាន $\lfloor \sqrt{4n^2+n} \rfloor = 2n$

យើងបាន $\sqrt{4n^2+n} - \lfloor \sqrt{4n^2+n} \rfloor = \sqrt{4n^2+n} - 2n$

$$\Rightarrow \{\sqrt{4n^2+n}\} = \sqrt{4n^2+n} - 2n$$

បង្ហាញថា $\sqrt{4n^2+n} - 2n < \frac{1}{4}$

យើងមាន $\sqrt{4n^2 + n} - 2n < \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sqrt{4n^2 + n} < 2n + \frac{1}{4}$

$$\Leftrightarrow 4n^2 + n < 4n^2 + n + \frac{1}{16}$$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{1}{16} \text{ ពិត}$$

ដូចនេះ $\left\{ \sqrt{4n^2 + n} \right\} < \frac{1}{4}$

សំណួរ ៨

ចំពោះ $a, b, c > 0$ និង p, q ផ្ទៀងផ្ទាត់ $p+q=1$ ។ បង្ហាញថា a, b, c ជាជ្រុងសំប្រុងនៃត្រីកោណមួយ កាលណា $pa^2 + qb^2 > pqc^2$ ។

ចម្លើយ

យើងមាន $p+q=1 \Rightarrow q=1-p$

យើងបាន $Q = pa^2 + qb^2 - pqc^2$

$$= pa^2 + (1-p)b^2 - p(1-p)c^2$$

$$= c^2 p^2 + (a^2 - b^2 - c^2)p + b^2$$

គេបាន $\Delta = (a^2 - b^2 - c^2)^2 - 4b^2 c^2$

$$= (a^2 - b^2 - c^2 - 2bc)(a^2 - b^2 - c^2 + 2bc)$$

$$= [a^2 - (b+c)^2][a^2 - (b-c)^2]$$

$$= (a+b+c)(a-b-c)(a+b-c)(a-b+c)$$

$Q > 0$ កាលណា $\Delta < 0$ (ព្រោះ $c^2 > 0$)

$$\Leftrightarrow (a+b+c)(a-b-c)(a+b-c)(a-b+c) > 0$$

$$\Leftrightarrow (b+c-a)(a+b-c)(c+a-b) > 0 \quad (*)$$

បើពីក្នុងចំណោម $b+c-a, a+b-c, c+a-b$ អវិជ្ជមាន

$$\Rightarrow a < 0, b < 0 \text{ រឺ } c < 0 \text{ ផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម}$$

ហេតុនេះ (*) ពិត កាលណា

$$b+c-a > 0, a+b-c > 0 \text{ និង } c+a-b > 0$$

$$\Leftrightarrow b+c > a, a+b > c \text{ និង } c+a > b$$

ដូចនេះ a, b, c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ កាលណា

$$pa^2 + qb^2 > pqc^2$$

លំហាត់ ៩

គេឲ្យ $a \geq b \geq c > 0$ និង $a+b+c \leq 1$ ។ បង្ហាញថា $a^2 + 3b^2 + 5c^2 \leq 1$ ។

(កម្ពុជា, 2014)

ចម្លើយ

ដោយ $a \geq b \geq c > 0$ និង $a+b+c \leq 1$

$$\text{យើងបាន } a^2 + 3b^2 + 5c^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2b^2 + 2c^2 + 2c^2$$

$$\leq a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$= (a+b+c)^2 \leq 1^2 = 1$$

ដូចនេះ $a^2 + 3b^2 + 5c^2 \leq 1$

លំហាត់ ១០

គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ មានមេគុណ

a_i បំពេញលក្ខខណ្ឌ $0 \leq a_i \leq a_0$ ចំពោះ $i = \overline{1, n}$ ។

យក $[f(x)]^2 = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots + b_{2n}x^{2n}$ ។

បង្ហាញថា $b_{n+1} \leq \frac{1}{2}[f(1)]^2$ ។

(កម្ពុជា, 2008)

ចម្លើយ

យើងមាន $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \Rightarrow [f(x)]^2 = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)^2$

ដោយ $[f(x)]^2 = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + \dots + b_{2n}x^{2n}$

ប្រៀបធៀបមេគុណនៃ x^{n+1} យើងបាន

$$b_{n+1} = a_1a_n + a_2a_{n-1} + \dots + a_n a_1 \leq a_1a_0 + a_2a_0 + \dots + a_n a_0$$

$$\Rightarrow 2b_{n+1} \leq a_1(a_0 + a_n) + a_2(a_0 + a_{n-1}) + \dots + a_n(a_0 + a_1)$$

$$\leq a_1(a_0 + \dots + a_n) + a_2(a_0 + \dots + a_n) + \dots + a_n(a_0 + \dots + a_n)$$

$$= (a_0 + a_1 + \dots + a_n)(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$$

$$\leq (a_0 + a_1 + \dots + a_n)^2 = [f(1)]^2$$

ដូចនេះ $b_{n+1} \leq \frac{1}{2}[f(1)]^2$



វិសមភាពងាយ

ដើម្បីឈានទៅដល់វិសមភាពងាយនេះ យើងសង្កេតមើលសមភាពពីជគណិត ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយជាមុនសិន គឺ

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \quad (*)$$

សម្រាយ

របៀបទី ១

យើងមាន $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

$$\begin{aligned} &= (a+b)^3 + c^3 - 3ab(a+b+c) \\ &= (a+b+c)[(a+b)^2 - c(a+b) + c^2] - 3ab(a+b+c) \\ &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= \frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \end{aligned}$$

របៀបទី ២

យក $P(x)$ ជាពហុធាដឺក្រេទី ៣ ដែលមានរឹស a, b, c យើងបាន

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-a)(x-b)(x-c) \\ &= x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc \end{aligned}$$

ជំនួស a, b, c ក្នុង $P(x)$ គេបាន

$$a^3 - (a+b+c)a^2 + (ab+bc+ca)a - abc = 0$$

$$b^3 - (a+b+c)b^2 + (ab+bc+ca)b - abc = 0$$

$$c^3 - (a + b + c)c^2 + (ab + bc + ca)c - abc = 0$$

$$\text{បូក អង្គ និង អង្គ } a^3 + b^3 + c^3 - (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2)$$

$$+ (ab + bc + ca)(a + b + c) - 3abc = 0$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$- (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = 0$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a + b + c)[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$$

របៀបទី ៣

$$\text{ប្រើដេទែមីណង់លំដាប់ ៣ } D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{ម្យ៉ាងទៀត } D &= \begin{vmatrix} a+b+c & b & c \\ a+b+c & c & a \\ a+b+c & a & b \end{vmatrix} = (a+b+c)D = \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & c & a \\ 1 & a & b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \quad (2) \end{aligned}$$

តាម (1),(2) យើងបាន

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 - 3abc &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= \frac{1}{2}(a + b + c)[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2] \end{aligned}$$

សង្កេតលើសមភាព (*)

$$\text{បើ } a + b + c = 0 \text{ គេបាន } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \quad (i)$$

បើ $a, b, c > 0$ គេបាន $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ ¹

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $a = b = c$

សំណួរ ១

ដាក់ $(x - y)^3 + (y - z)^3 + (z - x)^3$ ជាផលគុណកត្តា ។

ចម្លើយ

បើយក $a = x - y, b = y - z, c = z - x$ គេបាន $a + b + c = 0$

តាម (i) យើងបាន

$$(x - y)^3 + (y - z)^3 + (z - x)^3 = 3(x - y)(y - z)(z - x)$$

សំណួរ ២

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$ ជាចំនួនសនិទាន ។

ចម្លើយ

យក $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} \in \mathbb{R} \Rightarrow x - \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} - \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} = 0$

បើយក $a = x, b = -\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}, c = -\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$

គេបាន $a + b + c = 0$

តាម (i) យើងបាន $x^3 - 2 - \sqrt{5} - 2 + \sqrt{5} = 3x\sqrt{(2 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})}$

$$x^3 + 3x - 4 = 0$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 4) = 0$$

យើងបាន $x = 1$ ជាចំនួនសនិទាន

¹ វិសមភាព Cauchy រឺ AM-GM ចំពោះបីចំនួនពិតវិជ្ជមាន

លំហាត់ ៣

ឧបមាថា a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3 + c^3 + 3abc}{2}} \geq \max(a, b, c) \text{ ។}$$

ចម្លើយ

ដោយ វិសមភាពមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីធៀបនឹងអថេរ a, b, c

WLOG ឧបមាថា $a \geq b \geq c$

យើងបាន $\sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3 + c^3 + 3abc}{2}} \geq \max(a, b, c)$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3 + c^3 + 3abc}{2}} \geq a \Leftrightarrow -a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (-a)^3 + b^3 + c^3 - 3(-a)bc \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(-a + b + c)[(a + b)^2 + (a + c)^2 + (b - c)^2] \geq 0 \text{ ពិត}$$

ព្រោះ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ



លំហាត់

1. គេឲ្យ x, y, z ជាបីចំនួនគត់បំពេញលក្ខខណ្ឌ
 $(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = xyz$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា
 $x^3 + y^3 + z^3$ ចែកដាច់នឹង $x + y + z + 6$ ។
2. យក a, b, c ជាបីចំនួនពិតបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{4} = 0$ ។
 បង្ហាញថា $a = b = c = 0$ ។
3. រកសំណុំចំណុច (x, y) ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $x^3 + y^3 + 3xy = 1$ ។
4. តាង S ជាសំណុំនៃចំនួនគត់ x ដែល $x = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
 $(a, b, c$ ជាចំនួនគត់) ។ បង្ហាញថា បើ $x, y \in S$ គេបាន $xy \in S$ ។
5. គេអោយ a, b, c ជាបីចំនួនគត់វិជ្ជមានផ្សេងគ្នា និង k ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។
 បង្ហាញថា បើ $ab + bc + ca \geq 3k^2 - 1$ គេបាន
 $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} - abc \geq 3k$ ។
6. ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x, y, z បង្ហាញថា $x^2 + y^2 + z^2 \geq |xy + yz + zx|$ ។
7. បើ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{abc} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ ។
8. (Romania, 2007)
 ចំពោះគ្រប់ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ស្រាយបញ្ជាក់ថា
 $\frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} \geq xyz + \frac{3}{4}[(x - y)(y - z)(z - x)]$ ។
9. (UK, 2008)
 រកតម្លៃអប្បបរមានៃ $x^2 + y^2 + z^2$ បើគេដឹងថា x, y, z ជាបីចំនួនពិត

បំពេញលក្ខខណ្ឌ $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 1$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការ $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x+1} = 0$ ។

11. គេឲ្យ r ជាចំនួនពិតបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\sqrt[3]{r} + \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 3$ ។

គណនា $r^3 + \frac{1}{r^3}$ ។



ទម្រង់ Engel នៃវិសមភាព Cauchy-Schwarz
 (Arthur Engel's Minima Principle)

ទ្រឹស្តីបទ

ចំពោះ a_1, a_2, \dots, a_n ជាចំនួនពិត និង x_1, x_2, \dots, x_n

ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានគេបាន
$$\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_n},$$

$n \geq 2$ ។

សម្រាយ

ចំពោះ $n = 2$ យើងបាន

$$\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} \geq \frac{(a_1 + a_2)^2}{x_1 + x_2}$$

$$\Leftrightarrow a_1^2 x_2 (x_1 + x_2) + a_2^2 x_1 (x_1 + x_2) \geq (a_1 + a_2)^2 x_1 x_2$$

$$\Leftrightarrow (a_1 x_2 - a_2 x_1)^2 \geq 0 \text{ សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ } \frac{a_1}{x_1} = \frac{a_2}{x_2}$$

ឧបមាថា ពិតដល់ $n = k$ គឺ
$$\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_k^2}{x_k} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_k}$$

សិក្សាករណី $n = k + 1$

យើងមាន
$$\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_k^2}{x_k} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_k}$$

$$\Rightarrow \frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_k^2}{x_k} + \frac{a_{k+1}^2}{x_{k+1}} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_k} + \frac{a_{k+1}^2}{x_{k+1}}$$

រៀបរៀងដោយ ជា ពិសិដ្ឋ

វិសមភាព 360°

$$\geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1})^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_k + x_{k+1}}$$

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $\frac{a_1}{x_1} = \frac{a_2}{x_2} = \dots = \frac{a_{k+1}}{x_{k+1}}$

លំហាត់ ១

ចំពោះ a_1, a_2, \dots, a_n និង b_1, b_2, \dots, b_n ជាចំនួនពិត

បង្ហាញថា $(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$
 $\leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$ ។
 (វិសមភាព Cauchy-Schwarz)

ចម្លើយ

យើងមាន $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = \frac{(a_1b_1)^2}{b_1^2} + \frac{(a_2b_2)^2}{b_2^2} + \dots + \frac{(a_nb_n)^2}{b_n^2}$
 $\geq \frac{(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2}{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}$

គេបាន $(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$
 $\leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$

លំហាត់ ២

ចំពោះ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ ។
 (វិសមភាព Nesbitt)

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &= \frac{a^2}{ab+ac} + \frac{b^2}{bc+ab} + \frac{c^2}{ac+bc} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \end{aligned}$$

$$\text{ដោយ } a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0 \Rightarrow (a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$$

$$\text{គេបាន } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3(ab+bc+ca)}{2(ab+bc+ca)} = \frac{3}{2}$$

លំហាត់ ៣

យក $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n \text{ ។ បង្ហាញថា}$$

$$\frac{a_1^2}{a_1 + b_1} + \frac{a_2^2}{a_2 + b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{a_n + b_n} \geq \frac{1}{2}(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \text{ ។}$$

(APMO, 1991)

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } \frac{a_1^2}{a_1 + b_1} + \frac{a_2^2}{a_2 + b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{a_n + b_n} \\ &\geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n} \\ &= \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{2(a_1 + a_2 + \dots + a_n)} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{2} \end{aligned}$$

លំហាត់ ៤

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc = 1$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$

(IMO,1995)

ចម្លើយ

យើងមាន

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \\ &= \frac{1}{ab+ac} + \frac{1}{ab+bc} + \frac{1}{ac+bc} \geq \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2}{2(ab+bc+ca)} \\ & \geq \frac{ab+bc+ca}{2(abc)^2} \\ & \geq \frac{3}{2} \sqrt[3]{(abc)^2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

លំហាត់ ៥

ចំពោះ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+2c} + \frac{b}{c+2a} + \frac{c}{a+2b} \geq 1$$

(Czech and Slovak Republics,1999)

ចម្លើយ

យើងមាន

$$\frac{a}{b+2c} + \frac{b}{c+2a} + \frac{c}{a+2b} = \frac{a^2}{ab+2ac} + \frac{b^2}{bc+2ab} + \frac{c^2}{ac+2bc}$$

$$\geq \frac{(a+b+c)^2}{3(ab+bc+ca)} = 1$$

ព្រោះ $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$

លំហាត់ ៦

គេឲ្យ w, x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា

$$\frac{w}{x+2y+3z} + \frac{x}{y+2z+3w} + \frac{y}{z+2w+3x} + \frac{z}{w+2x+3y} \geq \frac{2}{3} \quad \uparrow$$

(Moldova, 2007)

ចម្លើយ

យើងមាន

$$\begin{aligned} & \frac{w}{x+2y+3z} + \frac{x}{y+2z+3w} + \frac{y}{z+2w+3x} + \frac{z}{w+2x+3y} \\ &= \frac{w^2}{wx+2wy+3wz} + \frac{x^2}{xy+2xz+3wx} + \frac{y^2}{yz+2wy+3xy} \\ & \quad + \frac{z^2}{wz+2xz+3yz} \\ & \geq \frac{(w+x+y+z)^2}{4(wx+xy+yz+zw+wy+xz)} \end{aligned}$$

បង្ហាញថា $\frac{(w+x+y+z)^2}{4(wx+xy+yz+zw+wy+xz)} \geq \frac{2}{3}$

យើងមាន $\frac{(w+x+y+z)^2}{4(wx+xy+yz+zw+wy+xz)} \geq \frac{2}{3}$

$$\Leftrightarrow 3(w^2+x^2+y^2+z^2) \geq 2(wx+xy+yz+zw+wy+xz) \text{ ពិត}$$

ព្រោះ តាម AM-GM គេបាន $w^2+x^2 \geq 2wx, x^2+y^2 \geq 2xy$

$$y^2 + z^2 \geq 2yz, z^2 + w^2 \geq 2zw$$

$$w^2 + y^2 \geq 2wy, x^2 + z^2 \geq 2xz$$

បូកអង្គ និង អង្គយើងបាន

$$3(w^2 + x^2 + y^2 + z^2) \geq 2(wx + xy + yz + zw + wy + xz)$$

លំហាត់ ៧

យក x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា

$$\frac{x^2}{(x+y)(x+z)} + \frac{y^2}{(y+z)(y+x)} + \frac{z^2}{(z+x)(z+y)} \geq \frac{3}{4} \text{ ។}$$

(Croatia, 2004)

ចម្លើយ

យើងមាន
$$\frac{x^2}{(x+y)(x+z)} + \frac{y^2}{(y+z)(y+x)} + \frac{z^2}{(z+x)(z+y)}$$

$$\geq \frac{(x+y+z)^2}{x^2 + y^2 + z^2 + 3(xy + yz + zx)}$$

បង្ហាញថា
$$\frac{(x+y+z)^2}{x^2 + y^2 + z^2 + 3(xy + yz + zx)} \geq \frac{3}{4}$$

យើងមាន
$$\frac{(x+y+z)^2}{x^2 + y^2 + z^2 + 3(xy + yz + zx)} \geq \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx \text{ ពិត}$$

លំហាត់ ៨

ចំពោះគ្រប់ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\frac{a}{10b+11c} + \frac{b}{10c+11a} + \frac{c}{10a+11b} \geq \frac{1}{7} \quad \text{។}$$

(ភ្នំពេញ, 2009)

បង្ហាញ

យើងមាន

$$\begin{aligned} & \frac{a}{10b+11c} + \frac{b}{10c+11a} + \frac{c}{10a+11b} \\ &= \frac{a^2}{10ab+11ac} + \frac{b^2}{10bc+11ab} + \frac{c^2}{10ac+11bc} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{21(ab+bc+ca)} \end{aligned}$$

ដោយ $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$

យើងបាន

$$\begin{aligned} & \frac{a}{10b+11c} + \frac{b}{10c+11a} + \frac{c}{10a+11b} \\ &\geq \frac{3(ab+bc+ca)}{21(ab+bc+ca)} = \frac{1}{7} \end{aligned}$$



លំហាត់

i. (វិសមភាព QM-AM)

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x_1, x_2, \dots, x_n បង្ហាញថា

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ ។}$$

ii. (Hungry,1996)

គេឲ្យ a, b ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a + b = 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a^2}{a+1} + \frac{b^2}{b+1} \geq \frac{1}{3}$ ។

iii. (MOSP,2000)

យក a, b, x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{x}{ay + bz} + \frac{y}{az + bx} + \frac{z}{ax + by} \geq \frac{3}{a + b} \text{ ។}$$

iv. (South Africa,1995)

យក a, b, c, d ជាបួនចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{4}{c} + \frac{16}{d} \geq \frac{64}{a + b + c + d} \text{ ។}$$

v. ចំពោះ a, b, c, d ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា

ក/ $8(a^4 + b^4) \geq (a + b)^4$

ខ/ 1. $\frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}$

2. $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ (Ireland,1998) ។

$$\text{គ/ } \frac{a^2+b^2}{a+b} + \frac{b^2+c^2}{b+c} + \frac{c^2+a^2}{c+a} \geq a+b+c$$

$$\text{ឃ/ } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+a} + \frac{d}{a+b} \geq 2$$

$$\text{ង/ } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+d} + \frac{c}{d+e} + \frac{d}{e+a} + \frac{e}{a+b} \geq \frac{5}{2} \quad \text{។}$$

vi. (Belarus 1999)

គេឲ្យ $a, b, c > 0$ ដែល $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{1}{1+ab} + \frac{1}{1+bc} + \frac{1}{1+ca} \geq \frac{3}{2} \quad \text{។}$$

vii. (IMO Shortlist, 1990)

គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានដែល $ab + bc + cd + da = 1$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3} \quad \text{។}$$

viii. (Thailand, 2006)

យក a, b ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន និង $k \in [0, \pi]$ ។ កំណត់ M ធំបំផុត

បើគេដឹងថា
$$\frac{1}{ka+b} + \frac{1}{kb+a} \geq \frac{M}{a+b} \quad \text{។}$$

ix. (Greece, 2007)

គេឲ្យ a, b, c ជាច្រើនវិជ្ជមាននៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{(c+a-b)^4}{a(a+b-c)} + \frac{(a+b-c)^4}{b(b+c-a)} + \frac{(b+c-a)^4}{c(c+a-b)} \geq ab + bc + ca \quad \text{។}$$

x. (Korea, 2007)

កំណត់តម្លៃវិជ្ជមាន k ទាំងអស់ដែលអាចមានបើគេដឹងថា

$$\frac{a}{c+kb} + \frac{b}{a+kc} + \frac{c}{b+ka} \geq \frac{1}{2007}$$

a, b, c ។

xi. (Greece,2008)

តើឱ្យ x_1, x_2, \dots, x_n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\left(\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_n} \right)^{\frac{kn}{t}} \geq x_1 x_2 \dots x_n \text{ ដែល } k = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

និង $t = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ។ តើសមភាពកើតឡើងនៅពេលណា ?



វិសមភាពនៃមធ្យម
(Mean Inequalities)

ទ្រឹស្តីបទ

ចំពោះ a_1, a_2, \dots, a_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន គេយក

$$QM = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}, \quad AM = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n},$$

$$GM = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad \text{និង} \quad HM = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

យើងបាន $QM \geq AM \geq GM \geq HM$ សមភាពលុះត្រាតែ

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n \text{ ។}$$

QM ហៅថា មធ្យមវិសការេ (Quadratic Mean)

AM ហៅថា មធ្យមនព្វន្ត (Arithmetic Mean)

GM ហៅថា មធ្យមធរណីមាត្រ (Geometric Mean)

HM ហៅថា មធ្យមអាម៉ូនិច (Harmonic Mean) ។

សម្រាយ

យើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ AM-GM ដោយប្រើវិធានកំណើនបែបកូស៊ី (Cauchy)

សម្រាប់ផ្នែកនៅសល់ (QM-AM និង GM-HM) សូមមិត្តអ្នកអានសាកល្បងស្រាយ

ដោយខ្លួនឯង។

ទម្រង់នៃវិធានកំណើនបែបកូស៊ី

ក/ បង្ហាញថា $p(2)$ ពិត

ខ/ ឧបមាថា $p(n)$ ពិត រួច ទាញថា $p(2n)$ ពិត និង $p(n-1)$ ពិត

គេបាន $p(n)$ ពិត ចំពោះគ្រប់ $n \geq 2$ ។

ចំពោះ $n = 2$ គេបាន វិសមភាពឱ្យ $\Leftrightarrow a_1 + a_2 \geq 2\sqrt{a_1 a_2}$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0 \text{ ពិត}$$

សមភាពលុះត្រាតែ $a_1 = a_2$

ឧបមាថា ពិតដល់ $n = k$ គឺ $a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq k\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k}$

❖ បង្ហាញថា $a_1 + a_2 + \dots + a_k + \dots + a_{2k} \geq 2k\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_{2k}}$

យើងមាន $a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_{k+1} + \dots + a_{2k}$

$$\geq k\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} + k\sqrt[k]{a_{k+1} a_{k+2} \dots a_{2k}}$$

$$= k\left(\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} + \sqrt[k]{a_{k+1} a_{k+2} \dots a_{2k}}\right)$$

$$\geq 2k\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k \dots a_{2k}} \text{ ពិត}$$

❖ បង្ហាញថា $a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} \geq (k-1)\sqrt[k-1]{a_1 a_2 \dots a_{k-1}}$

ចំពោះ $a_1, a_2, \dots, a_{k-1} \geq 0$ តាង $a_k = \sqrt[k-1]{a_1 a_2 \dots a_{k-1}}$

យើងបាន $a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq k\sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k}$

$$\Leftrightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq k\sqrt[k]{a_k^{k-1} a_k}$$

$$\Leftrightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq k a_k$$

គេបាន $a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} \geq (k-1)\sqrt[k-1]{a_1 a_2 \dots a_{k-1}}$ ពិត

ដូចនេះ $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$

សមភាពលុះត្រាតែ $a_1 = a_2 = \dots = a_n$

លំហាត់ ១

គេឲ្យ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ជាចម្លាស់មួយនៃ $\{b_1, b_2, \dots, b_n\} \subset \mathbb{R}^+$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} \geq n$

$$\frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_2} + \dots + \frac{b_n}{a_n} \geq n \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

ដោយ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ជាចម្លាស់មួយនៃ $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$

យើងបាន $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=1}^n b_i$

តាម AM-GM យើងបាន $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} \geq n \sqrt{\frac{\prod_{i=1}^n a_i}{\prod_{i=1}^n b_i}} = n$

និង $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} \geq n \sqrt{\frac{\prod_{i=1}^n b_i}{\prod_{i=1}^n a_i}} = n$

លំហាត់ ២

គេឲ្យ $a, b, c > 0$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc = 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{1+ab}{1+a} + \frac{1+bc}{1+b} + \frac{1+ca}{1+c} \geq 3$ ។

ចម្លើយ

យើងមាន
$$\frac{1+ab}{1+a} + \frac{1+bc}{1+b} + \frac{1+ca}{1+c} = \frac{1+ab}{abc+a} + \frac{1+bc}{abc+b} + \frac{1+ca}{abc+c}$$

$$= \frac{1}{a} \left(\frac{1+ab}{1+bc} \right) + \frac{1}{b} \left(\frac{1+bc}{1+ca} \right) + \frac{1}{c} \left(\frac{1+ca}{1+ab} \right)$$

តាម AM-GM យើងបាន
$$\frac{1+ab}{1+a} + \frac{1+bc}{1+b} + \frac{1+ca}{1+c}$$

$$\geq 3 \sqrt[3]{\left(\frac{1}{a}\right)\left(\frac{1+ab}{1+bc}\right)\left(\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1+bc}{1+ca}\right)\left(\frac{1}{c}\right)\left(\frac{1+ca}{1+ab}\right)}$$

$$= 3 \sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 3$$

ដូចនេះ:
$$\frac{1+ab}{1+a} + \frac{1+bc}{1+b} + \frac{1+ca}{1+c} \geq 3$$

សំណួរ ៣

គេឲ្យ $a, b, c > 0$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 2 \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) \geq \frac{9}{a+b+c}$$
 ។

ចម្លើយ

តាម AM-HM យើងបាន
$$\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2} \geq \frac{2}{a+b} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$$
 (1)

ដូចគ្នាដែរ
$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{4}{b+c}$$
 (2)

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{a} \geq \frac{4}{c+a}$$
 (3)

បូក (1),(2),(3) គេបាន
$$2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 4 \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 2 \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) \quad (*)$$

ម៉្យាងទៀត $\frac{\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}}{3} \geq \frac{3}{2(a+b+c)}$

$$\Rightarrow 2 \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) \geq \frac{9}{a+b+c} \quad (**)$$

តាម (*), (**) យើងបាន

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 2 \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) \geq \frac{9}{a+b+c}$$

លំហាត់ ៤

យក a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a+b+c=1$ ។

បង្ហាញថា $\sqrt{\left(\frac{1}{a}+1\right)\left(\frac{1}{b}+1\right)\left(\frac{1}{c}+1\right)} \geq 64$

$$2\sqrt{\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right)} \geq 8 \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

ក/

របៀបទី ១

យើងមាន $\frac{1}{a} + 1 = \frac{a+b+c}{a} + 1 = \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + 1 + 1$

តាម AM-GM យើងបាន $\frac{1}{a} + 1 \geq 4\sqrt{\frac{bc}{a^2}}$

ស្រាយដូចគ្នា គេបាន $\frac{1}{b} + 1 \geq 4\sqrt{\frac{ca}{b^2}}$, $\frac{1}{c} + 1 \geq 4\sqrt{\frac{ab}{c^2}}$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{a} + 1\right)\left(\frac{1}{b} + 1\right)\left(\frac{1}{c} + 1\right) \geq 64\sqrt{\frac{(bc)(ca)(ab)}{a^2b^2c^2}} = 64$$

របៀបទី ២

$$\left(\frac{1}{a} + 1\right)\left(\frac{1}{b} + 1\right)\left(\frac{1}{c} + 1\right) = 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{abc}$$

តាម AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{a} + 1\right)\left(\frac{1}{b} + 1\right)\left(\frac{1}{c} + 1\right) &\geq 1 + \frac{3}{\sqrt[3]{abc}} + \frac{3}{\sqrt[3]{(abc)^2}} + \frac{1}{abc} \\ &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{abc}}\right)^3 \end{aligned}$$

ម្យ៉ាងទៀត $a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{abc}} \geq 3$

ដូចនេះ $\left(\frac{1}{a} + 1\right)\left(\frac{1}{b} + 1\right)\left(\frac{1}{c} + 1\right) \geq 4^3 = 64$

ខ/

យើងមាន $\frac{1}{a} - 1 = \frac{a+b+c}{a} - 1 = 1 + \frac{b+c}{a} - 1 = \frac{b}{a} + \frac{c}{a}$

តាម AM-GM យើងបាន $\frac{1}{a} - 1 \geq \frac{2\sqrt{bc}}{a}$

ស្រាយដូចគ្នា គេបាន $\frac{1}{b} - 1 \geq \frac{2\sqrt{ca}}{b}$, $\frac{1}{c} - 1 \geq \frac{2\sqrt{ab}}{c}$

$$\text{ដូចនេះ: } \left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right) \geq \frac{8\sqrt{(bc)(ca)(ab)}}{abc} = 8$$

លំហាត់ ៥

ចំពោះគ្រប់ $a, b, c > 0$ បង្ហាញថា $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ (*)។

(វិសមភាព Nesbitt)

ចម្លើយ

តាង $x = b + c, y = c + a, z = a + b$

$$\text{យើងបាន } x + y + z = 2(a + b + c) \Rightarrow a + b + c = \frac{x + y + z}{2}$$

$$\text{គេបាន } a = \frac{y + z - x}{2}, b = \frac{z + x - y}{2}, c = \frac{x + y - z}{2}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{y + z - x}{x} + \frac{z + x - y}{y} + \frac{x + y - z}{z} \right) \geq \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{y}{x} + \frac{z}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{y} + \frac{x}{z} + \frac{y}{z} \geq 6 \text{ ពិត តាម AM-GM}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

របៀបទី ២

តាម AM-GM យើងបាន

$$(b+c) + (c+a) + (a+b) \geq 3\sqrt{(b+c)(c+a)(a+b)}$$

$$\Rightarrow 2(a+b+c) \geq 3\sqrt{(b+c)(c+a)(a+b)} \tag{1}$$

ហើយ $\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \geq \sqrt[3]{\left(\frac{1}{b+c}\right)\left(\frac{1}{c+a}\right)\left(\frac{1}{a+b}\right)}$ (2)

គុណ (1),(2) យើងបាន $2(a+b+c)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) \geq 9$

$$\Rightarrow 1 + \frac{a}{b+c} + 1 + \frac{b}{c+a} + 1 + \frac{c}{a+b} \geq \frac{9}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

សំណួរ ៦

គេឲ្យ x_1, x_2, \dots, x_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$\frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} + \dots + \frac{1}{x_n+1} = 1 \quad \text{។ បង្ហាញថា } x_1 x_2 \dots x_n \geq (n-1)^n \text{ ។}$$

ចម្លើយ

តាង $y_i = \frac{1}{x_i+1}$ ចំពោះ $i = \overline{1, n} \Rightarrow x_i = \frac{1}{y_i} - 1 = \frac{1-y_i}{y_i}$

ហើយ $\sum_i y_i = 1 \Rightarrow 1 - y_i = \sum_{j \neq i} y_j$

តាម AM-GM យើងបាន $1 - y_i \geq (n-1) \sqrt[n-1]{\prod_{j \neq i} y_j}$

គេបាន $\prod_i x_i = \prod_i \left(\frac{1-y_i}{y_i}\right) = \frac{\prod_i (1-y_i)}{\prod_i y_i}$

$$\geq \frac{\prod_i (n-1)^{n-1} \sqrt[n-1]{\prod_{j \neq i} y_j}}{\prod_i y_i} = \frac{(n-1)^n \prod_i y_i}{\prod_i y_i} = (n-1)^n$$

ដូចនេះ $x_1 x_2 \dots x_n \geq (n-1)^n$

លំហាត់ ៧

គេឲ្យ $n \geq 2$ និង x_1, x_2, \dots, x_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$\frac{1}{x_1 + 1998} + \frac{1}{x_2 + 1998} + \dots + \frac{1}{x_3 + 1998} = \frac{1}{1998} \quad \forall$$

បង្ហាញថា $\frac{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}}{n-1} \geq 1998 \quad \forall$

(Vietnam, 1998)

ចម្លើយ

យើងមាន $\frac{1}{x_1 + 1998} + \frac{1}{x_2 + 1998} + \dots + \frac{1}{x_3 + 1998} = \frac{1}{1998}$

$$\Rightarrow \frac{1998}{x_1 + 1998} + \frac{1998}{x_2 + 1998} + \dots + \frac{1998}{x_3 + 1998} = 1$$

តាង $\frac{1998}{x_i + 1998} = \frac{1}{1 + y_i}$ ចំពោះ $i = 1, n$

យើងបាន $y_i = \frac{x_i}{1998} > 0$ និង $\sum_i \frac{1}{1 + y_i} = 1$

តាមលំហាត់ ១ គេបាន $y_1 y_2 \dots y_n \geq (n-1)^n$

$$\Rightarrow \left(\frac{x_1}{1998}\right) \left(\frac{x_2}{1998}\right) \dots \left(\frac{x_n}{1998}\right) \geq (n-1)^n$$

$$\Rightarrow \frac{x_1 x_2 \dots x_n}{1998^n} \geq (n-1)^n$$

ដូចនេះ: $\frac{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}}{n-1} \geq 1998$

លំហាត់ ៨

គេឲ្យ a_1, a_2, \dots, a_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ដែល $a_1 + a_2 + \dots + a_n < 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a_1 a_2 \dots a_n (1 - a_1 - a_2 - \dots - a_n)}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \dots (1 - a_n)} \leq \frac{1}{n^{n+1}}$ (*) ។

(IMO Shortlist, 1998)

ចម្លើយ

តាង $a_{n+1} = 1 - a_1 - a_2 - \dots - a_n \Rightarrow 1 - a_i = \sum_{j \neq i} a_j$ និង $\sum_i a_i = 1$

យក $a_i = \frac{1}{x_i + 1}$ ចំពោះ $i = \overline{1, n+1} \Rightarrow x_i = \frac{1 - a_i}{a_i}$

គេបាន $\sum_i \frac{1}{x_i + 1} = 1$

តាម លំហាត់ ១ យើងបាន $x_1 x_2 \dots x_n x_{n+1} \geq n^{n+1}$

$$\Rightarrow \left(\frac{1 - a_1}{a_1} \right) \left(\frac{1 - a_2}{a_2} \right) \dots \left(\frac{1 - a_{n+1}}{a_{n+1}} \right) \geq n^{n+1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{a_1}{1 - a_1} \right) \left(\frac{a_2}{1 - a_2} \right) \dots \left(\frac{a_n}{1 - a_n} \right) \left(\frac{a_{n+1}}{1 - a_{n+1}} \right) \leq \frac{1}{n^{n+1}}$$

$$\Rightarrow \frac{a_1 a_2 \dots a_n (1 - a_1 - a_2 - \dots - a_n)}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \dots (1 - a_n)} \leq \frac{1}{n^{n+1}}$$

លំហាត់ ៩

គេឲ្យ $x, y > 1$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} \geq 8$ ។

(Russia, 1992)

ចម្លើយ

របៀបទី ១

តាង $a = x - 1, b = y - 1 > 0 \Rightarrow x = a + 1, y = b + 1$

គេបាន
$$\frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} = \frac{(a+1)^2}{b} + \frac{(b+1)^2}{a}$$

តាម AM-GM យើងបាន $a^2 + 1 \geq 2a \Rightarrow (a+1)^2 \geq 4a$

ដូចគ្នាដែរ $b^2 + 1 \geq 2b \Rightarrow (b+1)^2 \geq 4b$

យើងបាន
$$\frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} \geq 4\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) \geq 4(2) = 8$$

របៀបទី ២

តាម AM-GM យើងបាន
$$\frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} \geq 2\left(\frac{x}{\sqrt{x-1}}\right)\left(\frac{y}{\sqrt{y-1}}\right) \quad (*)$$

ចំពោះ $\forall a > 1$ យើងបាន $(\sqrt{a-1} - 1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{a}{\sqrt{a-1}} \geq 2$

ហេតុនេះ $(*) \Rightarrow \frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} \geq 2(2)(2) = 8$

លំហាត់ ១០

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $x + y + z = 3$ ។

បង្ហាញថា $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \geq xy + yz + zx$ ។

(Russia,1994)

ចម្លើយ

តាម AM-GM យើងបាន $x^2 + \sqrt{x} + \sqrt{x} \geq 3x$

$$y^2 + \sqrt{y} + \sqrt{y} \geq 3y$$

$$z^2 + \sqrt{z} + \sqrt{z} \geq 3z$$

បូកអង្គ និង អង្គយើងបាន

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) \geq 3(x + y + z)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) \geq (x + y + z)^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \geq xy + yz + zx$$

លំហាត់ ១១

គេឲ្យ x មិនមែនជាចំនួនគត់ ហើយ $x > 1$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\left(\frac{x + \{x\}}{[x]} - \frac{[x]}{x + \{x\}} \right) + \left(\frac{x + [x]}{\{x\}} - \frac{\{x\}}{x + [x]} \right) > \frac{9}{2} \quad (*)$$

(Mediterranean,2007)

ចម្លើយ

តាង $a = [x], r = \{x\}$

$$\text{យើងបាន } (*) \text{ សមមូល } \left(\frac{a + 2r}{a} - \frac{a}{a + 2r} \right) + \left(\frac{2a + r}{r} - \frac{r}{2a + r} \right) > \frac{9}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2 \left(\frac{r}{a} + \frac{a}{r} \right) - \left(\frac{a}{a + 2r} + \frac{r}{2a + r} \right) > \frac{5}{2}$$

ដោយ $\frac{r}{a} + \frac{a}{r} \geq 2$

ហើយ $a + 2r \geq a + r, 2a + r \geq a + r$

សមភាពកើតឡើងព្រមគ្នា កាលណា $a = r = 0$ (ជាករណីមិនអាច)

គេបាន $\frac{a}{a+2r} + \frac{r}{2a+r} < \frac{a}{a+r} + \frac{r}{a+r} = 1 < \frac{3}{2}$

យើងបាន $2\left(\frac{r}{a} + \frac{a}{r}\right) - \left(\frac{a}{a+2r} + \frac{r}{2a+r}\right) > 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$ ពិត

ដូចនេះ $\left(\frac{x + \{x\}}{[x]} - \frac{[x]}{x + \{x\}}\right) + \left(\frac{x + [x]}{\{x\}} - \frac{\{x\}}{x + [x]}\right) > \frac{9}{2}$

លំហាត់ ១២

គេឲ្យ $a, b, c > 0$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{1}{a^3 + b^3 + abc} + \frac{1}{b^3 + c^3 + abc} + \frac{1}{c^3 + a^3 + abc} \leq \frac{1}{abc} \quad \forall$$

(USAMO, 1997)

ចម្លើយ

យើងមាន $(a - b)^2(a + b) \geq 0$ ចំពោះ $a, b, c > 0$

$$\Rightarrow (a^2 - b^2)(a - b) \geq 0$$

$$\Rightarrow a^3 + b^3 \geq ab(a + b)$$

គេបាន $\frac{1}{a^3 + b^3 + abc} \leq \frac{1}{ab(a + b + c)}$ (1)

ដូចគ្នាដែរ យើងបាន $\frac{1}{b^3 + c^3 + abc} \leq \frac{1}{bc(a + b + c)}$ (2)

$$\frac{1}{c^3 + a^3 + abc} \leq \frac{1}{ca(a+b+c)} \quad (3)$$

បូក (1),(2),(3) យើងបាន

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a^3 + b^3 + abc} + \frac{1}{b^3 + c^3 + abc} + \frac{1}{c^3 + a^3 + abc} \\ & \leq \frac{1}{ab(a+b+c)} + \frac{1}{bc(a+b+c)} + \frac{1}{ca(a+b+c)} \\ & = \frac{a+b+c}{abc(a+b+c)} = \frac{1}{abc} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\frac{1}{a^3 + b^3 + abc} + \frac{1}{b^3 + c^3 + abc} + \frac{1}{c^3 + a^3 + abc} \leq \frac{1}{abc}$

សំណួរ ១៣

គេឲ្យ $x_i > 0$ ចំពោះ $i = \overline{1, n}$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2 \text{ ។}$$

ចម្លើយ

តាម AM-GM យើងបាន

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n\sqrt{x_1 x_2 \dots x_n}$$

និង $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \geq \frac{n}{\sqrt{x_1 x_2 \dots x_n}}$

គេបាន $(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)$

$$\geq \left(n\sqrt{x_1 x_2 \dots x_n} \right) \left(\frac{n}{\sqrt{x_1 x_2 \dots x_n}} \right) = n^2$$

លំហាត់ ១៤

គេឲ្យ $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ និង $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ។

បង្ហាញថា

$$\text{ក/ } \sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \geq \frac{n^2}{n-1}$$

$$\text{ខ/ } \sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{a_i} \geq n(n-1)$$

$$\text{គ/ } \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s-a_i} \geq \frac{n}{n-1} \quad \text{។}$$

(Australia, 1993)

ចម្លើយ

$$\text{ក/ យើងមាន } \sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \geq \frac{n^2}{n-1}$$

$$\Leftrightarrow (n-1) \sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \geq n^2 \quad (*) \quad \text{ដោយ } s = \sum_{i=1}^n a_i$$

$$\text{គេបាន } n-1 = n - \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{s} = \frac{s-a_1}{s} + \frac{s-a_2}{s} + \dots + \frac{s-a_n}{s} = \sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{s}$$

$$\text{យើងបាន } (*) \text{ សមមូល } \left(\sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{s} \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \right) \geq n^2 \text{ ពិត}$$

តាម លំហាត់ ១០

ដូចនេះ
$$\sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \geq \frac{n^2}{n-1}$$

ខ/ យើងមាន
$$\sum_{i=1}^n \frac{s-a_i}{a_i} \geq n(n-1)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{s}{a_i} - 1 \right) \geq n^2 - n \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{s}{a_i} \geq n^2 \quad (*)$$

ដោយ $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s} = 1$ ព្រោះ $s = \sum_{i=1}^n a_i$

គេបាន (*) សមមូល $\left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s} \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{s}{a_i} \right) \geq n^2$ ពិត តាម លំហាត់ ១០

គ/ តាម ក យើងបាន
$$\sum_{i=1}^n \frac{s}{s-a_i} \geq \frac{n^2}{n-1} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{s-a_i} + 1 \right) \geq \frac{n^2}{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{s-a_i} \right) + n \geq \frac{n^2}{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{s-a_i} \right) \geq \frac{n^2}{n-1} - n$$

$$= \frac{n}{n-1}$$

ដូចនេះ
$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s-a_i} \geq \frac{n}{n-1}$$

លំហាត់ ១៥

ចំពោះ $n \geq 1$ ជាចំនួនគត់ បង្ហាញថា $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{2}{3}$ ។

ចម្លើយ

តាម AM-HM យើងបាន
$$\frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}}{n+1} > \frac{n+1}{n+(n+1)+\dots+2n}$$

$$= \frac{n+1}{(n+1)(n+2n)} = \frac{2}{3n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \text{ ដោយ } 1 + \frac{1}{n} > 1$$

ដូចនេះ
$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{2}{3}$$

សំណួរ ១៦

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $xyz = 1$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{3}{4} \text{ ។}$$

(IMO Shortlist.1998)

ចម្លើយ

តាម AM-GM យើងបាន
$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{1+y}{8} + \frac{1+z}{8} \geq \frac{3x}{4}$$

គេបាន
$$\sum_{cyc} \frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{1}{4} \sum_{cyc} (1+x) \geq \frac{3}{4} \sum_{cyc} \frac{3x}{4}$$

$$\Rightarrow \sum_{cyc} \frac{x^3}{(1+y)(1+z)} \geq \frac{1}{4} \sum_{cyc} (2x-1) \geq \frac{3}{4}$$

សមភាពលុះត្រាតែ $x = y = z = 1$

លំហាត់ ១៧

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\left(1 + \frac{x}{y}\right)\left(1 + \frac{y}{z}\right)\left(1 + \frac{z}{x}\right) \geq 2 + \frac{2(x+y+z)}{\sqrt[3]{xyz}} \quad ។$$

(APMO, 1998)

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } & \left(1 + \frac{x}{y}\right)\left(1 + \frac{y}{z}\right)\left(1 + \frac{z}{x}\right) \geq 2 + \frac{2(x+y+z)}{\sqrt[3]{xyz}} \\ \Leftrightarrow & \frac{x}{z} + \frac{z}{y} + \frac{y}{x} + \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq \frac{2(x+y+z)}{\sqrt[3]{xyz}} \quad \text{ពិត} \end{aligned}$$

ព្រោះ តាម AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} \frac{x}{z} + \frac{z}{y} + \frac{y}{x} + \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} &= x\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) + y\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{x}\right) + z\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \\ &= (x+y+z)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) - 3 \\ &\geq \frac{3(x+y+z)}{\sqrt[3]{xyz}} - 3 \\ &= \frac{2(x+y+z) + (x+y+z - 3\sqrt[3]{xyz})}{\sqrt[3]{xyz}} \\ &\geq \frac{2(x+y+z)}{\sqrt[3]{xyz}} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \left(1 + \frac{x}{y}\right)\left(1 + \frac{y}{z}\right)\left(1 + \frac{z}{x}\right) \geq 2 + \frac{2(x+y+z)}{\sqrt[3]{xyz}}$$

សមភាពលុះត្រាតែ $x = y = z$

លំហាត់ ១៨

គេឲ្យ $a, b, c, d \geq 0$ ។ បង្ហាញថា

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{4}} \geq \sqrt[3]{\frac{abc + bcd + cda + abd}{4}} \quad \forall$$

ចម្លើយ

តាម AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} abc + bcd + cda + abd &= bc(a+d) + ad(b+c) \\ &\leq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2 (a+d) + \left(\frac{a+d}{2}\right)^2 (b+c) \\ &= (b+c)(a+d) \left(\frac{a+b+c+d}{4}\right) \\ &\leq \left(\frac{a+b+c+d}{2}\right)^2 \left(\frac{a+b+c+d}{4}\right) \\ &= \frac{(a+b+c+d)^3}{16} \end{aligned}$$

$$\text{គេបាន } \sqrt[3]{\frac{abc + bcd + cda + abd}{4}} \leq \frac{a+b+c+d}{4}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត តាម AM-QM គេបាន } \frac{a+b+c+d}{4} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{4}}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{4}} \geq \sqrt[3]{\frac{abc + bcd + cda + abd}{4}}$$

សមភាពលុះត្រាតែ $a = b = c = d$

លំហាត់ ១៩

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $x^5 + y^5 + z^5 = 3$ ។

បង្ហាញថា $\frac{x^4}{y^3} + \frac{y^4}{z^3} + \frac{z^4}{x^3} \geq 3$ ។

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } (x^5 + y^5 + z^5)^2 &= x^{10} + 2x^5y^5 + y^{10} + 2y^5z^5 + z^{10} + 2z^5x^5 \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$\text{តាម AM-GM យើងបាន } 10\frac{x^4}{y^3} + 6x^5y^5 + 3x^{10} \geq 19x^{\frac{100}{19}}$$

$$10\frac{y^4}{z^3} + 6y^5z^5 + 3y^{10} \geq 19y^{\frac{100}{19}}$$

$$10\frac{z^4}{x^3} + 6z^5x^5 + 3z^{10} \geq 19z^{\frac{100}{19}}$$

បូកអង្គ និង អង្គយើងបាន

$$10\left(\frac{x^4}{y^3} + \frac{y^4}{z^3} + \frac{z^4}{x^3}\right) + 3(x^5 + y^5 + z^5)^2 \geq 19\left(x^{\frac{100}{19}} + y^{\frac{100}{19}} + z^{\frac{100}{19}}\right)$$

$$\Rightarrow 10\left(\frac{x^4}{y^3} + \frac{y^4}{z^3} + \frac{z^4}{x^3}\right) + 27 \geq 19\left(x^{\frac{100}{19}} + y^{\frac{100}{19}} + z^{\frac{100}{19}}\right)$$

$$\text{បង្ហាញថា } x^{\frac{100}{19}} + y^{\frac{100}{19}} + z^{\frac{100}{19}} \geq 3$$

តាម AM-GM យើងមាន

$$1 + 19x^{\frac{100}{19}} = 1 + \underbrace{x^{\frac{100}{19}} + x^{\frac{100}{19}} + \dots + x^{\frac{100}{19}}}_{19 \text{ ឥដ្ឋ}} \geq 20x^5$$

យើងបាន $\sum_{cyc} \left(1 + 19x^{\frac{100}{19}}\right) \geq 20 \sum_{cyc} x^5 \Leftrightarrow 19 \sum_{cyc} x^{\frac{100}{19}} \geq 20(3) - 3 = 57$

គេបាន $x^{\frac{100}{19}} + y^{\frac{100}{19}} + z^{\frac{100}{19}} \geq 3$


ដូចនេះ $\frac{x^4}{y^3} + \frac{y^4}{z^3} + \frac{z^4}{x^3} \geq 3$ សមភាពលុះត្រាតែ $x = y = z = 1$

សំណួរ ២០

គេឲ្យ ABC ជាត្រីកោណសម្បងមានរង្វាស់ជ្រុង a ។ យក M ជាចំណុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណនេះ ហើយ D, E, F ជាចំណោលកែងនៃ M លើជ្រុង BC, CA និង AB រៀងគ្នា ។ បង្ហាញថា

ក/ $\frac{1}{MD} + \frac{1}{ME} + \frac{1}{MF} \geq \frac{6\sqrt{3}}{a}$

ខ/ $\frac{1}{MD+ME} + \frac{1}{ME+MF} + \frac{1}{MF+MD} \geq \frac{3\sqrt{3}}{a}$ ។



សម្រាយ

ក/

តាង $x = MD$, $y = ME$, $z = MF$

យើងមាន $(ABC) = (BCM) + (CAM) + (ABM)$

$$\Rightarrow ah = ax + ay + az \text{ ដែល } h = \frac{\sqrt{3}}{2} a \text{ (កម្ពស់ត្រីកោណ } ABC \text{)}$$

$$\Rightarrow h = x + y + z \text{ }^1$$

តាម AM-GM យើងបាន
$$h \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = (x + y + z) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \geq 9 \sqrt[3]{\frac{xyz}{xyz}} = 9$$

គេបាន
$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq \frac{9}{h} = \frac{6\sqrt{3}}{a}$$

សរុបមក
$$\frac{1}{MD} + \frac{1}{ME} + \frac{1}{MF} \geq \frac{6\sqrt{3}}{a}$$

ខ/

តាម AM-GM យើងបាន

$$(x + y + y + z + z + x) \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \right) \geq 9 \sqrt[3]{\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{(x+y)(y+z)(z+x)}} = 9$$

1 Viviani's lemma

គេបាន $2h\left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x}\right) \geq 9$


$$\Rightarrow \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} \geq \frac{9}{2h} = \frac{3\sqrt{3}}{a}$$

លំហាត់ ២១

យក h_a, h_b, h_c ជាកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល A, B, C រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ដែលចារឹកក្រៅរង្វង់ដែលមានផ្ចិត I កាំ r ។

បង្ហាញថា $\text{ក/ } \frac{r}{h_a} + \frac{r}{h_b} + \frac{r}{h_c} = 1$

$$\text{ខ/ } h_a + h_b + h_c \geq 9r \quad \text{។}$$



សម្រាយ

ក/

យើងមាន $\frac{(IBC)}{(ABC)} = \frac{ra}{h_a a} = \frac{r}{h_a}$

ដូចគ្នាដែរ $\frac{(ICA)}{(ABC)} = \frac{r}{h_b}, \frac{(IAB)}{(ABC)} = \frac{r}{h_c}$

យើងបាន $\frac{r}{h_a} + \frac{r}{h_b} + \frac{r}{h_c} = \frac{(IBC)}{(ABC)} + \frac{(ICA)}{(ABC)} + \frac{(IAB)}{(ABC)} = \frac{(ABC)}{(ABC)} = 1$

ខ/

$$\begin{aligned} \text{តាម AM-GM យើងបាន } (h_a + h_b + h_c) \left(\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right) &\geq 9 \\ \Rightarrow \frac{1}{r} (h_a + h_b + h_c) &\geq 9 \end{aligned}$$


ដូចនេះ $h_a + h_b + h_c \geq 9r$

សំណាត់ ២២

គេឲ្យ ABC មួយមានកម្ពស់ AD , BE , CF ហើយ H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ

នេះ ។ បង្ហាញថា ក/ $\frac{AD}{HD} + \frac{BE}{HE} + \frac{CF}{HF} \geq 9$

ខ/ $\frac{HD}{HA} + \frac{HE}{HB} + \frac{HF}{HC} \geq \frac{3}{2}$ ។



សម្រាយ

ក/

តាង $S = (ABC)$, $S_1 = (HBC)$, $S_2 = (HCA)$ និង $S_3 = (HAB)$

ABC និង HBC ជាត្រីកោណដែលមានបាតរួម

យើងបាន $\frac{S_1}{S} = \frac{HD}{AD}$

ដូចគ្នាដែរ $\frac{S_2}{S} = \frac{HE}{BE}, \frac{S_3}{S} = \frac{HF}{CF}$

គេបាន $\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{S} = \frac{S}{S} = 1$

តាម AM-GM យើងបាន $\left(\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF}\right)\left(\frac{AD}{HD} + \frac{BE}{HE} + \frac{CF}{HF}\right) \geq 9$

សរុបមក $\frac{AD}{HD} + \frac{BE}{HE} + \frac{CF}{HF} \geq 9$

ខ/

យើងមាន $\frac{HD}{HA} = \frac{HD}{AD - HD} = \frac{S_1}{S - S_1} = \frac{S_1}{S_2 + S_3}$

ដូចគ្នាដែរ $\frac{HE}{HB} = \frac{S_2}{S_3 + S_1}, \frac{HF}{HC} = \frac{S_3}{S_1 + S_2}$

យើងបាន $\frac{HD}{HA} + \frac{HE}{HB} + \frac{HF}{HC} = \frac{S_1}{S_2 + S_3} + \frac{S_2}{S_3 + S_1} + \frac{S_3}{S_1 + S_2}$

តាមវិសមភាព Nesbitt $\frac{S_1}{S_2 + S_3} + \frac{S_2}{S_3 + S_1} + \frac{S_3}{S_1 + S_2} \geq \frac{3}{2}$

ដូចនេះ $\frac{HD}{HA} + \frac{HE}{HB} + \frac{HF}{HC} \geq \frac{3}{2}$



លំហាត់

1. កំណត់តម្លៃតូចបំផុតនៃ $x(1-x^3)$ បើ $0 \leq x \leq 1$ ។
2. យក a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a+b+c=1$ ។
រកតម្លៃអប្បបរមានៃ $abc + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ ។
3. យក a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា
$$\frac{1}{\sqrt{a+b-c}} + \frac{1}{\sqrt{b+c-a}} + \frac{1}{\sqrt{c+a-b}} \geq \frac{9}{ab+bc+ca}$$
 ។
4. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc=1$ ។
បង្ហាញថា $\sqrt{\frac{a+b}{a+1}} + \sqrt{\frac{b+c}{b+1}} + \sqrt{\frac{c+a}{c+1}} \geq 3$ ។
5. ឧបមាថា a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។
បង្ហាញថា $(a+b-c)^a (b+c-a)^b (c+a-b)^c \leq a^a b^b c^c$ ។
6. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមានដែល $a+b+c=2$ ។
បង្ហាញថា $a^2 b^2 + b^2 c^2 + c^2 a^2 \leq 2$ ។
7. គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា
$$\frac{1}{a^2+ab} + \frac{1}{b^2+bc} + \frac{1}{c^2+cd} + \frac{1}{d^2+da} \geq \frac{4}{ac+bd}$$
 ។
8. គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ
 $a+b+c+d+e=5$ ។ បង្ហាញថា
 $abc + bcd + cde + dea + eab \leq 5$ ។
9. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $a+b+c=3$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2} \geq \frac{3}{2}$ ។



វិសមភាព Cauchy-Schwarz

ទ្រឹស្តីបទ

ចំពោះ $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ជាចំនួនពិត គេបាន

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \quad \forall$$

សម្រាយ

យក $f(x) = \sum_{i=1}^n (a_i x - b_i)^2 = x^2 \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) - 2x \sum_{i=1}^n a_i b_i + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$

នោះ $f(x) \geq 0$ ដោយ $\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \Delta' \leq 0 &\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \leq 0 \\ &\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \end{aligned}$$

សមភាពពេល $a_i x - b_i = 0 \Leftrightarrow a_i x = b_i$ ចំពោះ $i = \overline{1, n}$

ពេល គឺ $\vec{u} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \vec{v} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ កូស៊ីនេអ៊ែត្វ

លំហាត់ ១

គេឲ្យ $a, b, c > 0$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a^2 - bc}{2a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b^2 - ca}{2b^2 + c^2 + a^2} + \frac{c^2 - ab}{2c^2 + a^2 + b^2} \geq 0 \quad \forall$$

ចម្លើយ

យើងមាន
$$\frac{a^2 - bc}{2a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b^2 - ca}{2b^2 + c^2 + a^2} + \frac{c^2 - ab}{2c^2 + a^2 + b^2} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} \frac{(a+b)^2}{a^2 + b^2 + 2c^2} \leq 3 \text{ ពិត}$$

ព្រោះ តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz គេបាន

$$\frac{(a+b)^2}{a^2 + b^2 + 2c^2} \leq \frac{a^2}{a^2 + c^2} + \frac{b^2}{b^2 + c^2}$$

យើងបាន
$$\sum_{cyc} \frac{(a+b)^2}{a^2 + b^2 + 2c^2} \leq \sum_{cyc} \frac{a^2}{a^2 + c^2} + \sum_{cyc} \frac{b^2}{b^2 + c^2} = 3$$

លំហាត់ ២

គេឲ្យ $x, y, z \geq 1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$ ។ បង្ហាញថា

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1} \quad \forall$$

(Iran MO, 1998)

ចម្លើយ

យើងមាន
$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \Rightarrow \frac{x-1}{x} + \frac{y-1}{y} + \frac{z-1}{z} = 1$$

តាម វិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\sum_{cyc} x = \left(\sum_{cyc} x \right) \left(\sum_{cyc} \frac{x-1}{x} \right) \geq \left(\sum_{cyc} \sqrt{x-1} \right)^2$$

ដូចនេះ
$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$$

លំហាត់ ៣

គេឲ្យ $a, b, c > 0$ ។ កំណត់តម្លៃតូចបំផុតនៃ $\frac{3a}{b+c} + \frac{4b}{c+a} + \frac{5c}{a+b}$ ។

ចម្លើយ

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\begin{aligned} & \frac{3a}{b+c} + 3 + \frac{4b}{c+a} + 4 + \frac{5c}{a+b} + 5 \\ &= (a+b+c) \left(\frac{3}{b+c} + \frac{4}{c+a} + \frac{5}{a+b} \right) \\ &= \frac{1}{2} [(b+c) + (c+a) + (a+b)] \left(\frac{3}{b+c} + \frac{4}{c+a} + \frac{5}{a+b} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} (\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5})^2 \end{aligned}$$

គេបាន $\frac{3a}{b+c} + \frac{4b}{c+a} + \frac{5c}{a+b} \geq \frac{1}{2} (\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5})^2 - 12$

ដូចនេះ តម្លៃតូចបំផុតនៃ $\frac{3a}{b+c} + \frac{4b}{c+a} + \frac{5c}{a+b}$ គឺ

$$\frac{1}{2} (\sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5})^2 - 12 \text{ សមភាពលុះត្រាតែ } \frac{b+c}{\sqrt{3}} = \frac{c+a}{2} = \frac{a+b}{\sqrt{5}}$$

លំហាត់ ៤

យក a, b, c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \quad \text{។}$$

(APMO, 1996)

ចម្លើយ

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} \leq \sqrt{2(a+b-c+b+c-a)} = 2\sqrt{b}$$

ស្រាយដូចគ្នាយើងបាន $\sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq 2\sqrt{c}$

$$\sqrt{c+a-b} + \sqrt{a+b-c} \leq 2\sqrt{a}$$

បូកអង្គ និង អង្គគេបាន

$$2(\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b}) \leq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})$$

ដូចនេះ $\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$

សមភាពលុះត្រាតែ $a = b = c$

លំហាត់ ៥

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិត ។

គេយក $x = \sqrt{b^2 - bc + c^2}$, $y = \sqrt{c^2 - ca + a^2}$ និង

$$z = \sqrt{a^2 - ab + b^2} \text{ ។}$$

បង្ហាញថា $xy + yz + zx \geq a^2 + b^2 + c^2$

(VME0,2006)

ចម្លើយ

យើងមាន $x = \sqrt{b^2 - bc + c^2} = \sqrt{\frac{3c^2}{4} + \left(b - \frac{c}{2}\right)^2}$

ហើយ $y = \sqrt{c^2 - ca + a^2} = \sqrt{\frac{3c^2}{4} + \left(a - \frac{c}{2}\right)^2}$

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$xy = \sqrt{\left[\frac{3c^2}{4} + \left(b - \frac{c}{2}\right)^2\right] \left[\frac{3c^2}{4} + \left(a - \frac{c}{2}\right)^2\right]}$$

$$\geq \frac{3c^2}{4} + \frac{1}{4}(2b-c)(2a-c)$$

គេបាន $\sum_{cyc} xy \geq \frac{3}{4} \sum_{cyc} c^2 + \frac{1}{4} \sum_{cyc} (2b-c)(2a-c) = \sum_{cyc} a^2$

ដូចនេះ $xy + yz + zx \geq a^2 + b^2 + c^2$

លំហាត់ ៦

បើសមីការ $x^4 + ax^3 + 2x^2 + bx + 1 = 0$ មានរឹសជាចំនួនពិតយ៉ាងហោចណាស់មួយ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2 + b^2 \geq 8$ ។

(Tournament of the Towns, 1993)

ចម្លើយ

បើ x ជារឹសនៃសមីការ យើងបាន $x^4 + ax^3 + 2x^2 + bx + 1 = 0$

$$\Rightarrow ax^3 + bx = -x^4 - 2x^2 - 1$$

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz គេបាន

$$(x^6 + x^2)(a^2 + b^2) \geq (ax^3 + bx)^2 = (x^4 + 2x^2 + 1)^2$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 \geq \frac{(x^4 + 2x^2 + 1)^2}{x^6 + x^2}$$

បង្ហាញថា $\frac{(x^4 + 2x^2 + 1)^2}{x^6 + x^2} \geq 8$

យើងមាន $\frac{(x^4 + 2x^2 + 1)^2}{x^6 + x^2} \geq 8 \Leftrightarrow (x^2 - 1)^2 \geq 0$ ពិត

ដូចនេះ $a^2 + b^2 \geq 8$



វិសមភាពនៃតម្រៀប
(Rearrangement Inequalities)

វិសមភាពនៃតម្រៀបនេះអាចត្រូវបានហៅថា វិសមភាពនៃចម្លាស់ ។

ប្រើស្តីបទ

គេមាន $2n$ ចំនួនពិតដែលកំណត់ដោយ $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$

និង $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ ។ ចំពោះគ្រប់ចម្លាស់ $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ នៃ

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ គេបានវិសមភាព } \sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a'_i b_i \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n a'_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a_{n+1-i} b_i \quad (2)$$

ចំពោះ (1) សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $a'_i = a_i, i = \overline{1, n}$

ចំណែក (2) សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $a'_i = a_{n+1-i}, i = \overline{1, n}$

សម្រាយ

ចំពោះ $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ និង a_1, a_2, \dots, a_n ជាចំនួនពិត

តាង $S = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_r b_r + \dots + a_s b_s + \dots + a_n b_n$

និង $S' = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_s b_r + \dots + a_r b_s + \dots + a_n b_n$

(S' ជាផលបូក S ដែលប្តូរទីតាំងរវាង a_r និង a_s)

យើងបាន $S - S' = a_r b_r + a_s b_s - a_s b_r - a_r b_s$

$$= (b_s - b_r)(a_s - a_r)$$

គេបាន $S \geq S'$ កាលណា $a_s \geq a_r$

តាមលក្ខណៈនេះ គេបាន S មានតម្លៃធំបំផុត ពេល $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$
និង មានតម្លៃតូចបំផុតពេល $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$

ដូចនេះ ទ្រឹស្តីបទត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់

កូរ៉ូលែ ១ (Corollary)

ចំពោះគ្រប់ចម្លាស់ $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ នៃ (a_1, a_2, \dots, a_n) គេបាន

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq a_1 a'_1 + a_2 a'_2 + \dots + a_n a'_n \text{ ។}$$

កូរ៉ូលែ ២ (Corollary)

ចំពោះគ្រប់ចម្លាស់ $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ នៃ (a_1, a_2, \dots, a_n) គេបាន

$$\frac{a'_1}{a_1} + \frac{a'_2}{a_2} + \dots + \frac{a'_n}{a_n} \geq n \text{ ។}$$



លំហាត់ ១

យក a, b, c ជាអន្តរាគមន៍វិជ្ជមាននៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា
 $a^2(b+c-a)+b^2(a+c-b)+c^2(a+b-c) \leq 3abc$ ។

(IMO,1964)

វិភាគ

ដោយ វិសមភាពមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីធៀបនឹង a, b, c

WLOG ឧបមាថា $c \leq b \leq a$

គេបាន $a(b+c-a) \leq b(a+c-b) \leq c(a+b-c)$
 (ការស្រាយទុកជាលំហាត់)

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀប យើងបាន

$$a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c) \leq ba(b+c-a)+cb(c+a-b)+ac(a+b-c) \quad (1)$$

$$a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c) \leq ca(b+c-a)+ab(c+a-b)+bc(a+b-c) \quad (2)$$

បូក (1) និង (2) យើងបាន

$$2[a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c)] \leq 6abc$$

ដូចនេះ $a^2(b+c-a)+b^2(a+c-b)+c^2(a+b-c) \leq 3abc$

លំហាត់ ២

ចំពោះ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2} \quad \text{។}$$

ចន្លើយ

របៀបទី ១

ដោយ វិសមភាពមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីធៀបនឹង a, b, c

WLOG សន្មតថា $a \leq b \leq c$

$$\text{យើងបាន } a + b \leq c + a \leq b + c \Rightarrow \frac{1}{b+c} \leq \frac{1}{c+a} \leq \frac{1}{a+b}$$

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀបគេបាន

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} + \frac{a}{a+b} \tag{1}$$

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{c}{b+c} + \frac{a}{c+a} + \frac{b}{a+b} \tag{2}$$

បូក (1),(2) យើងបាន $2\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right) \geq 3$

ដូចនេះ $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$

របៀបទី ២

តាមកូរ៉ូលែ ២ នៃវិសមភាពតម្រៀបគេបាន

$$\frac{c+a}{b+c} + \frac{a+b}{c+a} + \frac{b+c}{a+b} \geq 3 \tag{1}$$

$$\frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{c+a} + \frac{c+a}{a+b} \geq 3 \tag{2}$$

បូក (1) និង (2) យើងបាន

$$1 + \frac{2a}{b+c} + 1 + \frac{2b}{c+a} + 1 + \frac{2c}{a+b} \geq 6$$

ដូចនេះ $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$

លំហាត់ ៣

បើ $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ និង $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ បង្ហាញថា

$$\frac{a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n}{n} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n} \quad \text{។}$$

(Tchebyshev's Inequality)

ចម្លើយ

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀបយើងមាន

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \geq a_1b_2 + a_2b_3 + \dots + a_nb_1$$

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \geq a_1b_3 + a_2b_4 + \dots + a_nb_2$$

.....

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \geq a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_nb_{n-1}$$

បូកអង្គ និង អង្គគេបាន

$$n(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n) \geq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$$

ដូចនេះ $\frac{a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n}{n} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n}$

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ រឺ $b_1 = b_2 = \dots = b_n$

លំហាត់ ៤

គេឲ្យចំនួនពិត $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ និង $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$ ។

បើ (z_1, z_2, \dots, z_n) ជាចម្លោះនៃ (y_1, y_2, \dots, y_n) ។ បង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 \quad \forall$$

(IMO, 1975)

បន្លឺយ

ដោយ (z_1, z_2, \dots, z_n) ជាចម្លោះនៃ (y_1, y_2, \dots, y_n) គេបាន $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n z_i^2$

យើងបាន $\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i z_i + \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i y_i \geq \sum_{i=1}^n x_i z_i \quad \text{ពិត តាមវិសមភាពនៃគម្រៀប}$$

លំហាត់ ៥

គេឲ្យ x_1, x_2, \dots, x_n ជា n ចំនួនគត់វិជ្ជមានផ្សេងគ្នា ។ បង្ហាញថា

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \quad \forall$$

(IMO, 1978)

បន្លឺយ

យក (a_1, a_2, \dots, a_n) ជាចម្លោះនៃ (x_1, x_2, \dots, x_n) ដែល $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$

$$(b_1, b_2, \dots, b_n) = \left(\frac{1}{n^2}, \frac{1}{(n-1)^2}, \dots, \frac{1}{1^2} \right)$$

ចំពោះ $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ ជាចម្លោះនៃ (a_1, a_2, \dots, a_n) ដែល $a'_i = x_{n+1-i}$,

$$i = \overline{1, n}$$

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀបយើងបាន

$$\begin{aligned} \frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{n^2} &= a'_1 b_1 + a'_2 b_2 + \dots + a'_n b_n \\ &\geq a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \dots + a_1 b_n \\ &\geq \frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \dots + \frac{a_n}{n^2} \end{aligned}$$

ដោយ $1 \leq a_1, 2 \leq a_2, \dots, n \leq a_n$ យើងបាន

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1^2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n}{n^2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

សំណួរ ៦

យក a, b, c ជាអន្តរាគមន៍វិជ្ជមាននៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$a^2 b(a-b) + b^2 c(b-c) + c^2 a(c-a) \geq 0 \quad \forall$$

(IMO, 1983)

ចម្លើយ

សិក្សាករណី $c \leq b \leq a$ (ករណីផ្សេងទៀតស្រាយដូចគ្នា)

គេបាន $a(b+c-a) \leq b(c+a-b) \leq c(a+b-c)$

និង $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b} \leq \frac{1}{c}$

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀបគេបាន

$$\frac{a(b+c-a)}{a} + \frac{b(c+a-b)}{b} + \frac{c(a+b-c)}{c}$$

$$\geq \frac{a(b+c-a)}{c} + \frac{b(c+a-b)}{a} + \frac{c(a+b-c)}{b}$$

$$\Rightarrow a+b+c \geq \frac{a(b-a)}{c} + \frac{b(c-b)}{a} + \frac{c(a-c)}{b} + a+b+c$$

$$\Rightarrow \frac{a(b-a)}{c} + \frac{b(c-b)}{a} + \frac{c(a-c)}{b} \leq 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0$$

លំហាត់ ៧

ចំពោះចំនួនពិត x_1, x_2, \dots, x_n និង y_1, y_2, \dots, y_n ។ បង្ហាញថា

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \text{ សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ } \exists \lambda \in \mathbb{R}$$

ដែល $x_i = \lambda y_i, i = \overline{1, n}$ ។

(វិសមភាព Cauchy-Schwarz)

ចម្លើយ

បើ $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ រឺ $y_1 = y_2 = \dots = y_n = 0$ គេបាន $0 \leq 0$ ពិត

$$\text{ករណីផ្សេងពីនេះ តាង } S = \sqrt{\sum_i^n x_i^2} \text{ និង } T = \sqrt{\sum_i^n y_i^2}$$

យក $a_i = \frac{x_i}{S}$ និង $a_{n+i} = \frac{y_i}{T}$ ចំពោះ $i = \overline{1, n}$

តាមកូរ៉ូល ១ នៃវិសមភាពតម្រៀបយើងបាន

$$2 = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{S^2} + \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{T^2} = \sum_{i=1}^{2n} a_i^2$$

$$\geq a_1 a_{n+1} + a_2 a_{n+2} + \dots + a_n a_{2n} + a_{n+1} a_1 + \dots + a_{2n} a_n \geq 2 \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{ST} \right)$$

ដូចនេះ $\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$ សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ

$$a_i = a_{n+i} \Leftrightarrow x_i = \lambda y_i, \quad i = \overline{1, n} \quad \text{ដែល } \lambda = \frac{S}{T}$$

សម្គាល់

វិសមភាព Cauchy-Schwarz ក៏អាចធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់តាមសមភាព Lagrange (Lagrange's Identity) បានផងដែរ គឺ

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

គេបាន $\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$ ព្រោះ

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i y_j - x_j y_i)^2 \geq 0$$

លំហាត់ ៨

យក a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc = 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$ ។

(IMO, 1995)

ចម្លើយ

ដោយវិសមភាពមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីជ្រៀបនឹង a, b, c

WLOG សន្មតថា $c \leq b \leq a$

តាង $x = \frac{1}{a}, y = \frac{1}{b}, z = \frac{1}{c} \Rightarrow x \leq y \leq z$ និង $xyz = 1$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } & \frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \\ &= \frac{x^3}{\frac{1}{y} + \frac{1}{z}} + \frac{y^3}{\frac{1}{z} + \frac{1}{x}} + \frac{z^3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \\ &= \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \end{aligned}$$

ដោយ $x + y \leq z + x \leq y + z \Rightarrow \frac{x}{y+z} \leq \frac{y}{z+x} \leq \frac{z}{x+y}$

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀបគេបាន

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{xy}{y+z} + \frac{yz}{z+x} + \frac{zx}{x+y} \quad (1)$$

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{xz}{y+z} + \frac{yx}{z+x} + \frac{zy}{x+y} \quad (2)$$

បូក (1) និង (2) យើងបាន $\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2}$

តាម AM-GM គេបាន $\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{3}{2} \sqrt[3]{xyz} = \frac{3}{2}$ ពិត

លំហាត់ ៩

យក a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)\left(1 + \frac{b}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{a}\right) \geq 2\left(1 + \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}\right) \quad \forall$$

(APMO,1998)

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } & \left(1 + \frac{a}{b}\right)\left(1 + \frac{b}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{a}\right) \geq 2\left(1 + \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}\right) \\ \Leftrightarrow & \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} \geq \frac{2(a+b+c)}{\sqrt[3]{abc}} \quad (*) \end{aligned}$$

តាង $a = x^3, b = y^3, c = z^3$

(ព្រោះ • ជាប្រមាណវិធីក្នុងនៃ IR)

$$(*) \Leftrightarrow \frac{x^3}{y^3} + \frac{y^3}{z^3} + \frac{z^3}{x^3} + \frac{x^3}{z^3} + \frac{z^3}{y^3} + \frac{y^3}{x^3} \geq \frac{2(x^3 + y^3 + z^3)}{xyz}$$

$$\text{បើយក } (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6) = \left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}, \frac{x}{z}, \frac{z}{y}, \frac{y}{x}\right)$$

$$(a'_1, a'_2, a'_3, a'_4, a'_5, a'_6) = \left(\frac{y}{z}, \frac{z}{x}, \frac{x}{y}, \frac{z}{y}, \frac{y}{x}, \frac{x}{z}\right)$$

$$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6) = \left(\frac{x^2}{y^2}, \frac{y^2}{z^2}, \frac{z^2}{x^2}, \frac{x^2}{z^2}, \frac{z^2}{y^2}, \frac{y^2}{x^2}\right)$$

យើងបាន $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ និង $(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6)$

មានលំដាប់ដូចគ្នា

(បើកើន កើនដូចគ្នា បើចុះ ចុះដូចគ្នា)

ហើយ $(a'_1, a'_2, a'_3, a'_4, a'_5, a'_6)$ ជាចម្លាស់មួយនៃ $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$

តាមវិសមភាពនៃតម្រៀបគេបាន

$$\begin{aligned} \frac{x^3}{y^3} + \frac{y^3}{z^3} + \frac{z^3}{x^3} + \frac{x^3}{z^3} + \frac{z^3}{y^3} + \frac{y^3}{x^3} &\geq \frac{x^2y}{y^2z} + \frac{y^2z}{z^2x} + \frac{z^2x}{x^2y} \\ &\quad + \frac{x^2z}{z^2y} + \frac{z^2y}{y^2x} + \frac{y^2x}{x^2z} \\ &\geq \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy} + \frac{x^2}{zy} + \frac{z^2}{yx} + \frac{y^2}{xz} \\ &= \frac{2(x^3 + y^3 + z^3)}{xyz} \quad \text{ពិត} \end{aligned}$$



លំហាត់

i. ចំពោះគ្រប់ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a \quad \forall$$

ii. គេឲ្យ a, b, c ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc = 1$ ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\text{ក/ } a^3 + b^3 + c^3 + (ab)^3 + (bc)^3 + (ca)^3 \geq 2(a^2b + b^2c + c^2a)$$

$$\text{ខ/ } \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq a + b + c \quad \forall$$

iii. ចំពោះគ្រប់ a, b, c ជាបីចំនួនពិតវិជ្ជមានមិនសូន្យ បង្ហាញថា

$$\text{ក/ } \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}$$

$$\text{ខ/ } \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq \frac{a+b+c}{abc} \quad \forall$$

iv. យក a, b, c ជាជ្រុងស្រីកែងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{c+a-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3 \quad \forall$$

v. បើ $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+$ និង $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ។

$$\text{បង្ហាញថា ក/ } \frac{a_1}{s-a_1} + \frac{a_2}{s-a_2} + \dots + \frac{a_n}{s-a_n} \geq \frac{n}{n-1}$$

$$\text{ខ/ } \frac{s}{s-a_1} + \frac{s}{s-a_2} + \dots + \frac{s}{s-a_n} \geq \frac{n^2}{n-1} \quad \forall$$

vi. បើ $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+$ និង $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a_1}{2-a_1} + \frac{a_2}{2-a_2} + \dots + \frac{a_n}{2-a_n} \geq \frac{n}{2n-1}$

vii. (វិសមភាព QM-AM)

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x_1, x_2, \dots, x_n បង្ហាញថា

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad \text{។}$$

viii. (វិសមភាព AM-GM-HM)

យក $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

សមភាពកើតឡើងពេល $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ។

ix. គេឲ្យ a_1, a_2, \dots, a_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$a_1 a_2 \dots a_n = 1 \quad \text{។}$$

បង្ហាញថា $a_1^{n-1} + a_2^{n-1} + \dots + a_n^{n-1} \geq \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}$ ។

x. (China, 1989)

គេឲ្យ a_1, a_2, \dots, a_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1 \quad \text{។ បង្ហាញថា}$$

$$\frac{a_1}{\sqrt{1-a_1}} + \frac{a_2}{\sqrt{1-a_2}} + \dots + \frac{a_n}{\sqrt{1-a_n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n-1}} (\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n}) \quad \text{។}$$

xi. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a + b + c = 1$ ។

បង្ហាញថា ក/ $\sqrt{4a+1} + \sqrt{4b+1} + \sqrt{4c+1} < 5$

$$ខ/ \sqrt{4a+1} + \sqrt{4b+1} + \sqrt{4c+1} < \sqrt{21} \quad ។$$

xii. (IMO Shortlist,1990)

គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានដែល $ab + bc + cd + da = 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}$ ។

xiii. គេឲ្យ x_1, x_2, \dots, x_n ($n > 2$) ជាចំនួនពិតដែលផលបូកនៃ $n-1$

ក្នុងចំណោម n ចំនួននេះធំជាងចំនួនមួយទៀតដែលនៅសល់ ។

តាង $s = \sum_{k=1}^n x_k$ ។ បង្ហាញថា $\sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{s - 2x_k} \geq \frac{s}{n-2}$ ។




វិសមភាព យ៉ែនស៊ែន
(Jensen's Inequalities)

និយមន័យ

អនុគមន៍ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ហៅថា ផតលើចន្លោះ $I = [a, b]$ បើចំពោះគ្រប់ $t \in [0, 1]$ និង $a \leq x < y \leq b$ គេបាន

$$f[ty + (1-t)x] \leq tf(y) + (1-t)f(x) \text{ ។}$$

មានន័យថាក្រាបនៃ f ចន្លោះអាប់ស៊ីស x និង y ស្ថិតនៅក្រោមអង្កត់ដែលភ្ជាប់ពីចំណុច $(x, f(x))$ ទៅចំណុច $(y, f(y))$ (ដូចរូប) ។



Lemma

បើ f ផតលើ $[a, b]$ គេបាន $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$ ចំពោះ $\forall x, y \in [a, b]$ ។

សម្រាយ

យើងមាន f ផតលើ $[a, b]$

យើងបាន $f[ty + (1-t)x] \leq tf(y) + (1-t)f(x)$ ចំពោះ $\forall x, y \in [a, b]$

រៀបរៀងដោយ ជា ពិសិដ្ឋ

វិសមភាព 360°

បើ $t = \frac{1}{2}$ គេបាន $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$

ទ្រឹស្តីបទ (វិសមភាព Jensen)

បើ f ផតលើ $[a, b]$ និង $t_1, t_2, \dots, t_n \in [0, 1]$ ដែល $\sum_{i=1}^n t_i = 1$ គេបាន

$$f(t_1x_1 + t_2x_2 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + t_2f(x_2) + \dots + t_nf(x_n) \quad (9)$$

ចំពោះគ្រប់ $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ ។

សម្រាយ

យើងមាន f ផតលើ $[a, b]$

យើងបាន $f(t_1x_1 + t_2x_2 + \dots + t_nx_n)$

$$= f\left[(1-t_n)\left(\frac{t_1x_1}{1-t_n} + \frac{t_2x_2}{1-t_n} + \dots + \frac{t_{n-1}x_{n-1}}{1-t_n}\right) + t_nx_n\right]$$

$$\leq (1-t_n)f\left(\frac{t_1x_1}{1-t_n} + \frac{t_2x_2}{1-t_n} + \dots + \frac{t_{n-1}x_{n-1}}{1-t_n}\right) + t_nx_n$$

.....

$$\leq (1-t_n)\left[\frac{t_1f(x_1)}{1-t_n} + \frac{t_2f(x_2)}{1-t_n} + \dots + \frac{t_{n-1}f(x_{n-1})}{1-t_n}\right] + t_nx_n$$

$$= t_1f(x_1) + t_2f(x_2) + \dots + t_nf(x_n)$$

សម្គាល់

តាម (9) បើយក $t_1 = t_2 = \dots = t_n$ គេបាន

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \quad (*)$$

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា (*) ក៏អាចស្រាយបញ្ជាក់ដោយប្រើ Lemma ខាងលើ និង វិធានកំណើនបែបកូស៊ីផងដែរ ។

- អនុគមន៍ប៉ោងក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរ គឺគ្រាន់តែប្តូរទិសដៅ \leq ទៅ \geq ។
- គេអាចប្រើដេរីវេលំដាប់ ២ ដើម្បីបង្ហាញថា អនុគមន៍មួយប៉ោង រឺ ផុត គឺ បើ $f''(x) < 0$ ចំពោះ $\forall x \in I \Rightarrow f$ ប៉ោងលើ I
 បើ $f''(x) > 0$ ចំពោះ $\forall x \in I \Rightarrow f$ ផុតលើ I ។

លំហាត់ ១

បើ $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ បង្ហាញថា

ក/ $4(a^3 + b^3) \geq (a + b)^3$

ខ/ $9(a^3 + b^3 + c^3) \geq (a + b + c)^3$ ។

ចម្លើយ

អនុគមន៍ $f(x) = x^3$ ជាអនុគមន៍ផុតលើ $[0, +\infty)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

ក/ $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} \Rightarrow \left(\frac{a+b}{2}\right)^3 \leq \frac{a^3 + b^3}{2}$

ហេតុនេះ $4(a^3 + b^3) \geq (a + b)^3$

ខ/ $f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3} \Rightarrow \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \leq \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3}$

ដូចនេះ $9(a^3 + b^3 + c^3) \geq (a + b + c)^3$

លំហាត់ ២

រកតម្លៃតូចបំផុតនៃ k បើចំពោះ $\forall a, b > 0$ យើងបាន

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} \leq k\sqrt[3]{a+b} \quad \forall$$

ចម្លើយ

អនុគមន៍ $f(x) = \sqrt[3]{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} < 0$

ចំពោះ $\forall x > 0$ គេថា f ប៉ោងលើ $(0, +\infty)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\begin{aligned} \frac{f(a) + f(b)}{2} &\leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) \Rightarrow \frac{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}}{2} \leq \sqrt[3]{\frac{a+b}{2}} \\ &\Rightarrow \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} \leq \sqrt[3]{4}\sqrt[3]{a+b} \end{aligned}$$

ដើម្បីឲ្យ $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} \leq k\sqrt[3]{a+b}$ ចំពោះ $\forall a, b > 0$

$$\text{លុះត្រាតែ } \sqrt[3]{4}\sqrt[3]{a+b} \leq k\sqrt[3]{a+b} \Rightarrow k \geq \sqrt[3]{4}$$

$$\text{ហេតុនេះ } k_{\min} = \sqrt[3]{4}$$

លំហាត់ ៣

គេឲ្យ $x, y, z \geq 0$ ។

$$\text{បង្ហាញថា } \sqrt{x^2+1} + \sqrt{y^2+1} + \sqrt{z^2+1} \geq \sqrt{6(x+y+z)} \quad \forall$$

ចម្លើយ

អនុគមន៍ $f(t) = \sqrt{t^2+1}$ ជាអនុគមន៍ផុតលើ $[0, +\infty)$

$$\text{ព្រោះ } f''(t) = \frac{1}{(\sqrt{t^2+1})^3} > 0, \quad \forall t \geq 0$$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\frac{f(x)+f(y)+f(z)}{3} \geq f\left(\frac{x+y+z}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1}}{3} \geq \sqrt{\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^2+1}$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1} \geq \sqrt{(x+y+z)^2+9}$$

បង្ហាញថា $(x+y+z)^2+9 \geq 6(x+y+z)$

យើងមាន $(x+y+z)^2+9 \geq 6(x+y+z)$

$$\Leftrightarrow (x+y+z)^2 - 6(x+y+z) + 9 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x+y+z-3)^2 \geq 0 \text{ ពិត}$$

ហេតុនេះ: $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}+\sqrt{z^2+1} \geq \sqrt{6(x+y+z)}$

សំណួរ ៤

យក f ជាអនុគមន៍ផិតលើ $[a,b]$ ។ ចំពោះគ្រប់ $x, y, z \in [a,b]$

យើងបាន

$$f\left(\frac{x+y+z}{3}\right) + \frac{f(x)+f(y)+f(z)}{3}$$

$$\geq \frac{2}{3} \left[f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{y+z}{2}\right) + f\left(\frac{z+x}{2}\right) \right] (*)$$

(វិសមភាព Popoviciu)

សម្រាយ

(*) ជាវិសមភាពស៊ីមេទ្រីធៀបនឹង x, y, z

WLOG សន្មតថា $x \leq y \leq z$

បើ $y \leq \frac{x+y+z}{3} \Rightarrow \frac{x+y+z}{3} \leq \frac{x+z}{2} \leq z$ និង

$$\frac{x+y+z}{3} \leq \frac{y+z}{2} \leq z$$

នោះ $\exists s, t \in [0,1]$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{x+z}{2} = \left(\frac{x+y+z}{3}\right)s + z(1-s)$

និង $\frac{y+z}{2} = \left(\frac{x+y+z}{3}\right)t + z(1-t)$

បូកអង្គ និង អង្គយើងបាន $\frac{x+y-2z}{2} = \left(\frac{x+y-2z}{3}\right)(s+t)$

$$\Rightarrow s+t = \frac{3}{2}$$

ដោយ f ផតលើ $[a,b]$ ហេតុនេះ $\forall x, y, z \in [a,b]$ គេបាន

$$f\left(\frac{x+z}{2}\right) \leq sf\left(\frac{x+y+z}{3}\right) + (1-s)f(z)$$

$$f\left(\frac{y+z}{2}\right) \leq tf\left(\frac{x+y+z}{3}\right) + (1-t)f(z)$$

ហើយ $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$

បូកអង្គ និង អង្គគេបាន $f\left(\frac{x+y+z}{3}\right) + \frac{f(x)+f(y)+f(z)}{3}$
 $\geq \frac{2}{3}\left[f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{y+z}{2}\right) + f\left(\frac{z+x}{2}\right)\right]$

ស្រាយដូចគ្នា ករណី $y > \frac{x+y+z}{3}$

លំហាត់ ៥

ចំពោះ $a, b, c > 0$ បង្ហាញថា

$$\left(\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}\right) \geq 4\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right) \text{ ។}$$

ចម្លើយ

អនុគមន៍ $f(x) = x + \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0 \Rightarrow f$ ជាអនុគមន៍ផតលើ $(0, +\infty)$

តាមវិសមភាព Popoviciu យើងបាន

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{9}{a+b+c} \geq \frac{4}{b+c} + \frac{4}{c+a} + \frac{4}{a+b}$$

ដូចនេះ $\left(\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}\right) \geq 4\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right)$

លំហាត់ ៦

យក a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{(b+c)^2} + \frac{b}{(c+a)^2} + \frac{c}{(a+b)^2} \geq \frac{9}{4(a+b+c)} \text{ (*) ។}$$

ចម្លើយ

(*) ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន

WLOG សន្មតថា $a+b+c=1$

គេបាន (*) សមមូល $\frac{a}{(1-a)^2} + \frac{b}{(1-b)^2} + \frac{c}{(1-c)^2} \geq \frac{9}{4}$

ពិនិត្យ $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ ជាអនុគមន៍ផុតលើ $[0, +\infty)$

ព្រោះ $f''(x) = \frac{4+2x}{(1-x)^4} > 0$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3} \Rightarrow f(a)+f(b)+f(c) \geq 3f\left(\frac{1}{3}\right)$$

ដោយ $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\frac{1}{3}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{3}{4}$

ហេតុនេះ $\frac{a}{(1-a)^2} + \frac{b}{(1-b)^2} + \frac{c}{(1-c)^2} \geq \frac{9}{4}$

ដូចនេះ $\frac{a}{(b+c)^2} + \frac{b}{(c+a)^2} + \frac{c}{(a+b)^2} \geq \frac{9}{4(a+b+c)}$

សំណាត់ ៧

ចំពោះ $0 \leq x, y \leq 1$ បង្ហាញថា $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \leq \frac{2}{\sqrt{1+xy}}$ (*)។

ចម្លើយ

បើ $x = 0$ រឺ $y = 0$ គេបាន (*) ពិត

បើ $0 < x, y \leq 1$ គេបាន $x = e^{-u}, y = e^{-v}$ ចំពោះ $u, v > 0$

យើងបាន (*) សមមូល $\frac{1}{\sqrt{1+e^{-2u}}} + \frac{1}{\sqrt{1+e^{-2v}}} \leq \frac{2}{\sqrt{1+e^{-u-v}}}$

អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើ $[0, +\infty)$

ព្រោះ $f''(x) = \frac{1-e^{2x}}{e^{4x}\sqrt{(1-e^{-2x})^5}} < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន $\frac{f(u)+f(v)}{2} \leq f\left(\frac{u+v}{2}\right)$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+e^{-2u}}} + \frac{1}{\sqrt{1+e^{-2v}}} \leq \frac{2}{\sqrt{1+e^{-u-v}}}$$

ដូចនេះ $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \leq \frac{2}{\sqrt{1+xy}}$

សំហាត់ ៨

គេឱ្យ $x_1, x_2, \dots, x_n, t_1, t_2, \dots, t_n$ ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានដែល $\sum_{i=1}^n t_i = 1$ ។

បង្ហាញថា $x_1^{t_1} x_2^{t_2} \dots x_n^{t_n} \leq t_1 x_1 + t_2 x_2 + \dots + x_n t_n$ (*) ។

(វិសមភាព Weighted AM-GM)

ចម្លើយ

ដោយ $f(x) = e^x$ ជាអនុគមន៍ផុត ព្រោះ $f''(x) = e^x > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

តាម វិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\begin{aligned} x_1^{t_1} x_2^{t_2} \dots x_n^{t_n} &= e^{t_1 \ln x_1} e^{t_2 \ln x_2} \dots e^{t_n \ln x_n} = e^{t_1 \ln x_1 + t_2 \ln x_2 + \dots + t_n \ln x_n} \\ &\leq t_1 e^{\ln x_1} + t_2 e^{\ln x_2} + \dots + t_n e^{\ln x_n} \\ &= t_1 x_1 + t_2 x_2 + \dots + t_n x_n \end{aligned}$$

សម្គាល់

បើ $t_1 = t_2 = \dots = t_n = \frac{1}{n}$ គេបាន (*) ក្លាយជាវិសមភាព AM-GM ។

លំហាត់ ៩

យក a, b, c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$(a+b-c)^a (b+c-a)^b (c+a-b)^c \leq a^a b^b c^c$$

ចម្លើយ

ដោយ a, b, c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ

យើងបាន $a+b-c > 0, b+c-a > 0$ និង $c+a-b > 0$

តាម Weighted AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} & \left(\frac{a+b-c}{a}\right)^{\frac{a}{a+b+c}} \left(\frac{b+c-a}{b}\right)^{\frac{b}{a+b+c}} \left(\frac{c+a-b}{c}\right)^{\frac{c}{a+b+c}} \\ & \leq \frac{1}{a+b+c} \left[\frac{a(a+b-c)}{a} + \frac{b(b+c-a)}{b} + \frac{c(c+a-b)}{c} \right] \\ & = \frac{a+b+c}{a+b+c} = 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $(a+b-c)^a (b+c-a)^b (c+a-b)^c \leq a^a b^b c^c$

លំហាត់ ១០

គេឲ្យ x, y ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បើ $a, b > 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ។

បង្ហាញថា $xy \leq \frac{1}{a}x^a + \frac{1}{b}y^b$ ។

(វិសមភាព Young)

សម្រាយ

តាម Weighted AM-GM យើងបាន $xy = (x^a)^{\frac{1}{a}}(y^b)^{\frac{1}{b}} \leq \frac{1}{a}x^a + \frac{1}{b}y^b$

លំហាត់ ១១

យក x_1, x_2, \dots, x_n និង y_1, y_2, \dots, y_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានហើយ $a, b > 0$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ។ បង្ហាញថា

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^a \right)^{\frac{1}{a}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^b \right)^{\frac{1}{b}} \text{ ។}$$

(វិសមភាព Holder)

ចម្លើយ

បើ $\sum_{i=1}^n x_i^a = 1$ និង $\sum_{i=1}^n y_i^b = 1$ តាម វិសមភាព Young

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } x_i y_i &\leq \frac{1}{a} x_i^a + \frac{1}{b} y_i^b \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \frac{1}{a} \sum_{i=1}^n x_i^a + \frac{1}{b} \sum_{i=1}^n y_i^b \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1 \end{aligned}$$

យក $\sum_{i=1}^n x_i^a = A, \sum_{i=1}^n y_i^b = B, x'_i = \frac{x_i}{A^{\frac{1}{a}}}$ និង $y'_i = \frac{y_i}{B^{\frac{1}{b}}}$

$$\text{គេបាន } \sum_{i=1}^n (x'_i)^a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^a}{A} = 1, \sum_{i=1}^n (y'_i)^b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i^b}{B} = 1$$

$$\text{យើងបាន } 1 \geq \sum_{i=1}^n x'_i y'_i = \sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{A^{\frac{1}{a}} B^{\frac{1}{b}}} = \frac{1}{A^{\frac{1}{a}} B^{\frac{1}{b}}} \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\text{ដូចនេះ: } \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^a \right)^{\frac{1}{a}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^b \right)^{\frac{1}{b}}$$

សំណត់ ១២

គេឲ្យ $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន និង $p > 1$ ។

$$\text{បង្ហាញថា } \left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right]^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \text{ ។}$$

(វិសមភាព Minkowski)

ចម្លើយ

$$\begin{aligned} \text{យើងមាន } (a_k + b_k)^p &= a_k(a_k + b_k)^{p-1} + b_k(a_k + b_k)^{p-1} \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p &= \sum_{k=1}^n a_k(a_k + b_k)^{p-1} + \sum_{k=1}^n b_k(a_k + b_k)^{p-1} \end{aligned}$$

ចំពោះ $q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ តាម វិសមភាព Holder យើងបាន

$$\sum_{i=1}^n a_k(a_k + b_k)^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{q(p-1)} \right]^{\frac{1}{q}}$$

$$\sum_{i=1}^n b_k(a_k + b_k)^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{q(p-1)} \right]^{\frac{1}{q}}$$

គេបាន

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \leq \left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{q(p-1)} \right]^{\frac{1}{q}} \left[\left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \right]$$

ចំពោះ $q(p-1) = p$

$$\text{យើងបាន } \left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right]^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

សង្កេត

បើ $p = 1$ សមភាពកើតឡើង

$$\text{បើ } 0 < p < 1 \text{ គេបាន } \left[\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right]^{\frac{1}{p}} \geq \left(\sum_{i=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

លំហាត់ ១៣

ចំពោះ $r_i > 1, i = \overline{1, n}$ បង្ហាញថា

$$\frac{1}{1+r_1} + \frac{1}{1+r_2} + \dots + \frac{1}{1+r_n} \geq \frac{n}{\sqrt[n]{r_1 r_2 \dots r_n} + 1} \quad \text{។}$$

(IMO Shortlist, 1998)

ចម្លើយ

អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ ផុតលើ \mathbb{R}^+

$$\text{ព្រោះ } f'(x) = \frac{-e^x}{(1+e^x)^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$$

ដោយ $r_i > 1$ យក $r_i = e^{x_i}, x_i > 0, i = \overline{1, n}$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\frac{1}{e^{\left(\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}\right)} + 1} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+e^{x_1}} + \frac{1}{1+e^{x_2}} + \dots + \frac{1}{1+e^{x_n}} \right)$$

ដូចនេះ: $\frac{1}{1+r_1} + \frac{1}{1+r_2} + \dots + \frac{1}{1+r_n} \geq \frac{n}{\sqrt[n]{r_1 r_2 \dots r_n} + 1}$

សំណួរ ១៤

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1 \quad \forall$$

(IMO, 2001)

ចម្លើយ

ដោយ $\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1$ ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន

WLOG សន្មត $a + b + c = 1$

អនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ជាអនុគមន៍ផុតលើ \mathbb{R}^+

តាម វិសមភាព Jensen យើងបាន

$$af(a^2 + 8bc) + bf(b^2 + 8ca) + cf(c^2 + 8ab) \geq f(M)$$

ដែល $M = \sum_{cyc} a(a^2 + 8bc) = 24abc + \sum_{cyc} a^3$

បង្ហាញថា $f(M) \geq 1$

យើងមាន $f(M) \geq 1 \Leftrightarrow M \leq 1$

$$\Leftrightarrow 24abc + \sum_{cyc} a^3 \leq \left(\sum_{cyc} a \right)^3$$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} c(a-b)^2 \geq 0 \text{ សមភាពពេល } a = b = c$$

ដូចនេះ: $\frac{a}{\sqrt{a^2 + 8bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 8ab}} \geq 1$

សំណាត់ ១៥

គេឲ្យ x_1, x_2, \dots, x_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ ។

បង្ហាញថា $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} \geq \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}}{\sqrt{n-1}}$ ។

(China, 1998)

ចម្លើយ

$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x}}$ ជាអនុគមន៍ផិតលើ $(0,1)$ ព្រោះ: $f''(x) > 0$

តាម វិសមភាព Jensen

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \geq f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = f\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n-1}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} \geq \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}}$$

បង្ហាញថា $\sqrt{n} \geq \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}$

តាម វិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន $\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \leq \sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i} = \sqrt{n}$

ដូចនេះ $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}} \geq \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}}{\sqrt{n-1}}$



វិសមភាព ស៊ីមេទ្រី
(Symmetric Inequalities)

និយមន័យ

អនុគមន៍ n អថេរ $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី រឺ ឆ្លុះ លុះត្រាតែ $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = f(a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(2)}, \dots, a_{\sigma(n)})$ ចំពោះគ្រប់ចម្លាស់ $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ នៃ $(1, 2, \dots, n)$ ។ ហេតុនេះ បើ $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌណាមួយ នោះ $f(a_{\sigma(1)}, a_{\sigma(2)}, \dots, a_{\sigma(n)})$ ក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនោះដែរ ។ វិសមភាពនៃអនុគមន៍ស៊ីមេទ្រី ហៅថាវិសមភាពស៊ីមេទ្រី ។ ដោយ \geq ជាទំនាក់ទំនងលំដាប់គ្រប់លើ \mathbb{R} (មានន័យថាគ្រប់ធាតុទាំងអស់នៃ \mathbb{R} សុទ្ធតែអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានដោយទំនាក់ទំនង \geq) ហេតុនេះ ដើម្បីស្រាយវិសមភាពស៊ីមេទ្រីយើងអាចរៀបអថេរទាំងអស់នៃវិសមភាពតាមលំដាប់ (ឧទាហរណ៍ $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$) ពេល គឺ ការសន្មតនេះមិននាំអោយបាត់បង់នូវលក្ខណៈទូទៅរបស់វិសមភាពទេ (WLOG: Without loss of generality) ។

ទ្រឹស្តីបទ (វិសមភាព Schur)

ចំពោះ $x, y, z \geq 0$ និង $r \in \mathbb{R}$ យើងបាន

$$x^r(x-z)(x-y) + y^r(y-x)(y-z) + z^r(z-x)(x-y) \geq 0$$

រឺ $\sum_{cyc} x^r(x-y)(x-z) \geq 0$ សមភាពលុះត្រាតែ $x = y = z$ រឺ $x = y, z = 0$

(និង ចម្លាស់ផ្សេងទៀត) ។

សម្រាយ

ដោយ វិសមភាពស៊ីមេទ្រីចំពោះអថេរ x, y, z

WLOG សន្មតថា $x \geq y \geq z$

ចំពោះ $r > 0$

យើងបាន $z^r(z-x)(z-y) \geq 0$ (1)

ហើយ $x^r(x-z) - y^r(y-z) = (x^{r+1} - y^{r+1}) + z(x^r - y^r) \geq 0$

$\Rightarrow x^r(x-y)(x-z) + y^r(y-x)(y-z) \geq 0$ (2)

តាម (1),(2) គេបាន $\sum_{cyc} x^r(x-y)(x-z) \geq 0$

ចំពោះ $r \leq 0$

យើងបាន $x^r(x-y)(x-z) \geq 0$ (3)

និង $z^r(x-z) - y^r(x-y) \geq z^r(x-y) - y^r(x-y)$
 $= (z^r - y^r)(x-y) \geq 0$ (4)

តាម (3),(4) យើងបាន $\sum_{cyc} x^r(x-y)(x-z) \geq 0$

ដូចនេះ $\sum_{cyc} x^r(x-y)(x-z) \geq 0$ សមភាពពេល $x = y = z$

រឺ $x = y, z = 0$ (និង ចម្លាស់ផ្សេងទៀត)

សម្គាល់

ចំពោះ $r = 1$, វិសមភាព Schur សមមូល

ក/ $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a)$

ខ/ $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b)$

គ/ $abc \geq (a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$ ។

(សូមសាកល្បងរករាងពិសេសផ្សេងទៀតនៃវិសមភាព Schur)

ដោយវិសមភាព Schur ជាវិសមភាពដែលត្រូវបានទាញចេញពីលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី

ដូចនេះ ភាគច្រើននៃវិសមភាពស៊ីមេទ្រី (ដ៏ក្រៃធំជាង រឺ ស្មើនឹង ៣) សុទ្ធតែអាចប្រើ

វិសមភាព Schur ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់ ។

លំហាត់ ១

គេឲ្យ a, b, c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$a^3(s-a)+b^3(s-b)+c^3(s-c)\leq abc s \quad ។$$

(s ជាកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ)

សម្រាយ

យើងមាន $a^3(s-a)+b^3(s-b)+c^3(s-c)\leq abc s$

$$\Leftrightarrow a^2(a-b)(a-c)+b^2(b-c)(b-a)+c^2(c-a)(c-b)\geq 0 \quad \text{ពិត}$$

តាមវិសមភាព Schur

លំហាត់ ២

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$27 + \left(2 + \frac{a^2}{bc}\right)\left(2 + \frac{b^2}{ca}\right)\left(2 + \frac{c^2}{ab}\right) \geq 6(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \quad ។$$

សម្រាយ

យើងមាន $27 + \left(2 + \frac{a^2}{bc}\right)\left(2 + \frac{b^2}{ca}\right)\left(2 + \frac{c^2}{ab}\right) \geq 6(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$

$$\Leftrightarrow 2abc(a^3+b^3+c^3+3abc-a^2b-a^2c-b^2a-b^2c-c^2a-c^2b) + (a^3b^3+b^3c^3+c^3a^3+3a^2b^2c^2-a^3bc^2-a^3b^2c-b^3a^2c-b^3ac^2-c^3a^2b-c^3ab^2) \geq 0 \quad \text{ពិត តាមវិសមភាព Schur ចំពោះអថេរ } a, b, c$$

និង ab, bc, ca

លំហាត់ ៣

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{a^2+bc}{(a+b)(a+c)} + \frac{b^2+ca}{(b+a)(b+c)} + \frac{c^2+ab}{(c+a)(c+b)} \quad ។$$

សម្រាយ

យើងមាន

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &\geq \frac{a^2+bc}{(a+b)(a+c)} + \frac{b^2+ca}{(b+a)(b+c)} + \frac{c^2+ab}{(c+a)(c+b)} \\ \Leftrightarrow \frac{a^3+b^3+c^3+3abc-ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c+a)}{(a+b)(b+c)(c+a)} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow a(a-b)(a-c)+b(b-a)(b-c)+c(c-a)(c-b) &\geq 0 \end{aligned}$$

ជាវិសមភាព Schur

លំហាត់ ៤

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{4b^2+bc+4c^2} + \frac{b}{4c^2+ca+4a^2} + \frac{c}{4a^2+ab+4b^2} \geq \frac{1}{a+b+c} \quad ។$$

សម្រាយ

តាម វិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\begin{aligned} &\frac{a}{4b^2+bc+4c^2} + \frac{b}{4c^2+ca+4a^2} + \frac{c}{4a^2+ab+4b^2} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{4a(b^2+c^2)+4b(c^2+a^2)+4c(a^2+b^2)+3abc} \end{aligned}$$

បង្ហាញថា
$$\frac{(a+b+c)^2}{4a(b^2+c^2)+4b(c^2+a^2)+4c(a^2+b^2)+3abc} \geq \frac{1}{a+b+c}$$

យើងមាន
$$\frac{(a+b+c)^2}{4a(b^2+c^2)+4b(c^2+a^2)+4c(a^2+b^2)+3abc} \geq \frac{1}{a+b+c}$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c)^3 \geq 4a(b^2+c^2)+4b(c^2+a^2)+4c(a^2+b^2)+3abc$$

$$\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3+3abc \geq a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)$$

ជាវិសមភាព Schur

លំហាត់ ៥

គេឲ្យ a, b, c ជាបីចំនួនពិត ។ បង្ហាញថា

$$a^6 + b^6 + c^6 + a^2b^2c^2 \geq \frac{2}{3} [a^5(b+c) + b^5(c+a) + c^5(a+b)] \quad \forall$$

សម្រាយ

តាមវិសមភាព AM-GM និង Schur យើងបាន

$$\begin{aligned} 3 \sum_{cyc} a^6 + 3a^2b^2c^2 &\geq 2 \sum_{cyc} a^6 + \sum_{cyc} a^4(b^2 + c^2) \\ &= \sum_{cyc} (a^6 + a^4b^2) + \sum_{cyc} (a^6 + a^4c^2) \\ &\geq 2 \sum_{cyc} a^5(b+c) \end{aligned}$$

លំហាត់ ៦

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $a + b + c = 2$ ។

បង្ហាញថា $a^4 + b^4 + c^4 + abc \geq a^3 + b^3 + c^3$ ។

សម្រាយ

តាមវិសមភាព Schur យើងបាន

$$a^r(a-b)(b-c) + b^r(b-c)(b-a) + c^r(c-a)(c-b) \geq 0$$

ចំពោះ $r = 2$ យើងបាន

$$\begin{aligned} a^4 + b^4 + c^4 + abc(a+b+c) &\geq a^3(b+c) + b^3(c+a) + c^3(a+b) \\ \Leftrightarrow 2(a^4 + b^4 + c^4) + abc(a+b+c) &\geq (a^3 + b^3 + c^3)(a+b+c) \end{aligned}$$

ដោយ $a + b + c = 2$

$$\text{ដូចនេះ: } a^4 + b^4 + c^4 + abc \geq a^3 + b^3 + c^3$$

លំហាត់ ៧

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a^2}{2b^2 - bc + 2c^2} + \frac{b^2}{2c^2 - ca + 2a^2} + \frac{c^2}{2a^2 - ab + 2b^2} \geq 1 \quad (1) \text{។}$$

សម្រាយ

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\sum_{cyc} \frac{a^2}{2b^2 - bc + 2c^2} \geq \frac{\left(\sum_{cyc} a^2 \right)^2}{\sum_{cyc} a^2 (2b^2 - bc + 2c^2)}$$

ដើម្បីបង្ហាញថា (1) ពិតយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\begin{aligned} \left(\sum_{cyc} a^2 \right)^2 &\geq \sum_{cyc} a^2 (2b^2 - bc + 2c^2) \\ &\Leftrightarrow \sum_{cyc} a^4 + abc \sum_{cyc} a \geq 2 \sum_{cyc} a^2 b^2 \end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Schur ចំពោះ $r = 2$ និង AM-GM យើងបាន

$$\sum_{cyc} a^4 + abc \sum_{cyc} a \geq \sum_{cyc} ab(a^2 + b^2) \geq 2 \sum_{cyc} a^2 b^2 \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះ:
$$\frac{a^2}{2b^2 - bc + 2c^2} + \frac{b^2}{2c^2 - ca + 2a^2} + \frac{c^2}{2a^2 - ab + 2b^2} \geq 1$$

លំហាត់ ៨

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a^3}{b^2 - bc + c^2} + \frac{b^3}{c^2 - ca + a^2} + \frac{c^3}{a^2 - ab + b^2} \geq a + b + c \quad (*) \text{។}$$

សម្រាយ

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\sum_{cyc} \frac{a^3}{b^2 - bc + b^2} = \sum_{cyc} \frac{a^4}{a(b^2 - bc + c^2)} \geq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{\sum_{cyc} a(b^2 - bc + c^2)}$$

ដើម្បីបង្ហាញថា (*) ពិត យើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\left(\sum_{cyc} a^2\right)^2 \geq \left(\sum_{cyc} a(b^2 - bc + c^2)\right)\left(\sum_{cyc} a\right)$$

យើងមាន $\left(\sum_{cyc} a^2\right)^2 \geq \left(\sum_{cyc} a(b^2 - bc + c^2)\right)\left(\sum_{cyc} a\right)$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} a^4 + 2\sum_{cyc} a^2b^2 \geq (a+b+c)\sum_{cyc} a^2(b+c) - 3abc\sum_{cyc} a$$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} a^4 + abc\sum_{cyc} a \geq \sum_{cyc} a^3(b+c) \text{ ជាវិសមភាព Schur}$$

លំហាត់ ៩

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$a^2\sqrt{b^2 - bc + c^2} + b^2\sqrt{c^2 - ca + a^2} + c^2\sqrt{a^2 - ab + b^2} \leq a^3 + b^3 + c^3 \quad (*) \quad ។$$

សម្រាយ

តាម វិសមភាព AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} \sum_{cyc} a^2\sqrt{b^2 - bc + c^2} &= \sum_{cyc} a\sqrt{a^2(b^2 - bc + c^2)} \\ &\leq \frac{1}{2}\sum_{cyc} a(a^2 + b^2 + c^2 - bc) \end{aligned}$$

ដើម្បីបង្ហាញថា (*) ពិតយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\frac{1}{2}\sum_{cyc} a(a^2 + b^2 + c^2 - bc) \leq \sum_{cyc} a^3$$

យើងមាន $\frac{1}{2}\sum_{cyc} a(a^2 + b^2 + c^2 - bc) \leq \sum_{cyc} a^3$

$$\Leftrightarrow 2\sum_{cyc} a^3 - \sum_{cyc} a(a^2 + b^2 + c^2 - bc) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} a^3 + 3abc - \sum_{cyc} ab(a+b) \geq 0 \text{ ពិតតាមវិសមភាព Schur}$$

លំហាត់ ១០

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a^3}{\sqrt{b^2 - bc + c^2}} + \frac{b^3}{\sqrt{c^2 - ca + a^2}} + \frac{c^3}{\sqrt{a^2 - ab + b^2}} \geq a^2 + b^2 + c^2 \text{ ។}$$

សម្រាយ

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\sum_{cyc} \frac{a^3}{\sqrt{b^2 - bc + c^2}} \geq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{\sum_{cyc} a\sqrt{b^2 - bc + c^2}}$$

ហេតុនេះ ដើម្បីបង្ហាញថា វិសមភាពពិតយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថា

$$\sum_{cyc} a\sqrt{b^2 - bc + c^2} \leq a^2 + b^2 + c^2$$

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz យើងបាន

$$\left(\sum_{cyc} a\sqrt{b^2 - bc + c^2} \right)^2 \leq \left(\sum_{cyc} a \right) \left(\sum_{cyc} a(b^2 - bc + c^2) \right)$$

តែ តាមវិសមភាព Schur យើងបាន

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{cyc} a^2 \right)^2 - \left(\sum_{cyc} a \right) \left(\sum_{cyc} a(b^2 - bc + c^2) \right) \\ &= \sum_{cyc} a^4 + abc \sum_{cyc} a - \sum_{cyc} a^3(b+c) \geq 0 \\ \Rightarrow & \left(\sum_{cyc} a \right) \left(\sum_{cyc} a(b^2 - bc + c^2) \right) \leq \left(\sum_{cyc} a^2 \right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \sum_{cyc} a\sqrt{b^2 - bc + c^2} \leq a^2 + b^2 + c^2$$

វិធីសាស្ត្រជំនួស
(The Substitution Strategy)

វិធីសាស្ត្រជំនួសជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់វិសមភាពដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំង ។ ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ការជំនួសទាំងអស់សុទ្ធតែផ្តល់មកវិញនូវភាពងាយស្រួលនោះទេ ។ ក្នុងផ្នែកនេះយើងសូមលើកយកនូវរបៀបនៃការជួសមួយចំនួនសម្រាប់មិនអ្នកអានដើម្បីទុកជាមូលដ្ឋាន ។

i. **ការជំនួសបែបពិគណិត** (Algebraic Substitution)

លំហាត់ ១

បើ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានតូចជាង 1 ដែល $a + b + c = 2$ ។

បង្ហាញថា $\left(\frac{a}{1-a}\right)\left(\frac{b}{1-b}\right)\left(\frac{c}{1-c}\right) \geq 8 \quad (*)$ ។

ចម្លើយ

តាង $x = 1 - a, y = 1 - b, z = 1 - c \Rightarrow x, y, z > 0$

យើងបាន $x + y + z = 3 - (a + b + c) = 1$

តើបាន $a = 1 - x = y + z, b = 1 - y = z + x, c = 1 - z = x + y$

ហេតុនេះ $(*) \Leftrightarrow \left(\frac{y+z}{x}\right)\left(\frac{z+x}{y}\right)\left(\frac{x+y}{z}\right) \geq 8$

$\Leftrightarrow (x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$ ពិត តាម AM-GM

លំហាត់ ២

យក a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc = 1$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$
 ។

(IMO, 1995)

ចម្លើយ

យក $x = ab, y = bc, z = ca \Rightarrow xyz = (abc)^2 = 1, x, y, z > 0$

យើងបាន

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \\ &= \frac{y}{xz(x+z)} + \frac{z}{xy(x+y)} + \frac{x}{yz(y+z)} \\ &= \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \end{aligned}$$

តាមវិសមភាព Cauchy-Schwarz និង AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \right) [(y+z) + (x+z) + (x+y)] \geq (x+y+z)^2 \\ \Rightarrow & \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)} = \frac{x+y+z}{2} \geq \frac{3}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ
$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$
 សមភាពលុះត្រាតែ

$$a = b = c = 1$$

លំហាត់ ៣

គេអោយ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $abc = 1$ ។ បង្ហាញថា

$$\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right)\left(b - 1 + \frac{1}{c}\right)\left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1 \quad \forall$$

(IMO, 2000)

ចម្លើយ

តាង $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$

យើងបាន (*) សមមូល $\left(\frac{x}{y} - 1 + \frac{z}{y}\right)\left(\frac{y}{z} - 1 + \frac{x}{z}\right)\left(\frac{z}{x} - 1 + \frac{y}{x}\right) \leq 1$

$$\Leftrightarrow (x - y + z)(y - z + x)(z - x + y) \leq xyz \quad (1)$$

បើ $(x - y + z)(y - z + x)(z - x + y) < 0 \Rightarrow (1)$ ពិត

បើ $(x - y + z)(y - z + x)(z - x + y) > 0$

(1) អាចសរសេរ $(x - y + z)^2(y - z + x)^2(z - x + y)^2 \leq x^2 y^2 z^2$ ពិត

ព្រោះ $(x - y + z)(y - z + x) = x^2 - (y - z)^2 \leq x^2$

$$(y - z + x)(z - x + y) = y^2 - (z - x)^2 \leq y^2$$

$$(z - x + y)(x - y + z) = z^2 - (x - y)^2 \leq z^2$$

ដូចនេះ $\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right)\left(b - 1 + \frac{1}{c}\right)\left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1$ សមភាពលុះត្រាតែ

$$a = b = c = 1$$

លំហាត់ ៤

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{c+a}{c+b} + \frac{a+b}{a+c} + \frac{b+c}{b+a} \quad (*) \text{ ។}$$

(India, 2002)

បង្ហាញ

តាង $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{b}{c}$, $z = \frac{c}{a}$ គេបាន $xyz = 1$

យើងបាន $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = x + y + z$

ហើយ $\frac{c+a}{c+b} + \frac{a+b}{a+c} + \frac{b+c}{b+a} = x + y + z + \frac{1-x}{1+y} + \frac{1-y}{1+z} + \frac{1-z}{1+x}$

$$\text{គេបាន } (*) \Leftrightarrow \frac{x-1}{1+y} + \frac{y-1}{1+z} + \frac{z-1}{1+x} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 1)(z+1) + (y^2 - 1)(x+1) + (z^2 - 1)(y+1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2z + y^2x + z^2y + x^2 + y^2 + z^2 \geq x + y + z + 3 \quad (1)$$

តាម AM-GM យើងមាន $x^2z + y^2x + z^2y \geq 3$

ប្រើទម្រង់ Engel នៃវិសមភាព Cauchy-Schwarz និង AM-GM យើងបាន

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{(x+y+z)^2}{3} \geq \frac{3(x+y+z)\sqrt[3]{xyz}}{3} = x + y + z$$

ហេតុនេះ (1) ពិត

ii. **ការជំនួសមេមត្រីកោណមាត្រ** (Trigonometric Substitution)

❖ សមភាពត្រីកោណមាត្រងាយៗមួយចំនួន ។

បើ α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ យើងបាន

$$I_1 : \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1 + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$I_2 : \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2}$$

$$I_3 : \sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma = 4 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$$

$$I_4 : \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2 + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$$

$$I_5 : \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} = 1$$

$$I_6 : \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$I_7 : \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$$

$$I_8 : \cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2} + \cot \frac{\gamma}{2} = \cot \frac{\alpha}{2} \cot \frac{\beta}{2} \cot \frac{\gamma}{2}$$

❖ វិសមភាពត្រីកោណមាត្រមួយចំនួនជួយក្នុងការស្រាយបញ្ជាក់ ។
 បើ α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ គេបាន

$$N_1 : \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$N_2 : \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$N_3 : \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3}{2}$$

$$N_4 : \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \leq \frac{1}{8}$$

$$N_5 : \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq \frac{3}{2}$$

$$N_6 : \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq \frac{1}{8}$$

$$N_7 : \cos \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\beta}{2} + \cos \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3}{2}$$

$$N_8 : \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$N_9 : \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma \leq \frac{9}{4}$$

$$N_{10} : \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} \geq \frac{3}{4}$$

$$N_{11} : \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma \geq \frac{3}{4}$$

$$N_{12} : \cos^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\beta}{2} + \cos^2 \frac{\gamma}{2} \leq \frac{9}{4}$$

$$N_{13} : \tan \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \geq \sqrt{3}$$

$$N_{14} : \cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2} + \cot \frac{\gamma}{2} \geq 3\sqrt{3}$$

$$N_{15} : \cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma \geq \sqrt{3}$$

សង្ខេប

N_1 យើងមាន $f(x) = \sin x$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើ $(0, \pi)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន $\frac{f(\alpha) + f(\beta) + f(\gamma)}{3} \leq f\left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}\right)$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}{3} \leq \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

N_2 : តាម AM-GM យើងបាន

$$\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \leq \left(\frac{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}{3} \right)^3 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{3} \right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$N_3 : \text{ដូច } N_1 \text{ យើងបាន } \frac{f\left(\frac{\alpha}{2}\right) + f\left(\frac{\beta}{2}\right) + f\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3} \leq f\left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\gamma}{2} \leq 3 \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3}{2}$$

$$N_4 : \text{ប្រើ } N_3 \text{ និង AM-GM គេបាន } N_4 : \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \leq \frac{1}{8}$$

$$N_5 : \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{យើងមាន } 3 - 2(\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma)$$

$$= 3 - 2[\cos \alpha + \cos \beta + \cos(\pi - (\alpha + \beta))]$$

$$= 3 - 2(\cos \alpha + \cos \beta - \cos(\alpha + \beta))$$

$$= 3 - 2(\cos \alpha + \cos \beta - \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$$

$$= \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 2 \sin \alpha \sin \beta + 1 + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta$$

$$- 2 \cos \alpha - 2 \cos \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta$$

$$= (\sin \alpha - \sin \beta)^2 + (1 - \cos \alpha - \cos \beta)^2 \geq 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq \frac{3}{2}$$

$N_6 :$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងមាន } \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] \cos \gamma \\
 &= \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) \cos \gamma - \frac{1}{2} \cos^2 \gamma \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\cos \gamma - \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) \right]^2 + \frac{1}{8} \cos^2(\alpha - \beta) \\
 &\leq \frac{1}{8} \cos^2(\alpha - \beta) \leq \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $N_6 : \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq \frac{1}{8}$

$$N_7 : \cos \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\beta}{2} + \cos \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3}{2}$$

យើងមាន $f(x) = \cos x$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងលើ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

ដោយ $\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}, \frac{\gamma}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\frac{f\left(\frac{\alpha}{2}\right) + f\left(\frac{\beta}{2}\right) + f\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3} \leq f\left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{6}\right)$$

$$\Rightarrow \cos \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\beta}{2} + \cos \frac{\gamma}{2} \leq 3 \cos \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}$$

ដូចនេះ $\cos \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\beta}{2} + \cos \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3}{2}$

$$N_8 : \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3\sqrt{3}}{8} \text{ ដោយ } \cos \frac{\alpha}{2} > 0, \cos \frac{\beta}{2} > 0, \cos \frac{\gamma}{2} > 0$$

ប្រើ N_7 និង AM-GM យើងបាន $\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$

$$N_9 : \text{តាម } I_4 \text{ និង } N_6 \text{ យើងបាន } \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma \leq \frac{9}{4}$$

$$N_{10} : \text{តាម } I_5 \text{ និង } N_4 \text{ យើងបាន } \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} \geq \frac{3}{4}$$

$N_{11} : \text{ យើងមាន}$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 3 - (\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma)$$

$$\text{តាម } N_9 : \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma \leq \frac{9}{4}$$

$$\text{យើងបាន } N_{11} : \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma \geq 3 - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

$N_{12} : \text{ យើងមាន}$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\beta}{2} + \cos^2 \frac{\gamma}{2} = 3 - \left(\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} \right)$$

$$\text{តាម } N_{10} : \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} \geq \frac{3}{4}$$

$$\text{យើងបាន } \cos^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\beta}{2} + \cos^2 \frac{\gamma}{2} \leq 3 - \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$$

$$N_{13} : \tan \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \geq \sqrt{3}$$

យើងមាន $f(x) = \tan x$ ជាអនុគមន៍ផុតលើ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\frac{\tan \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\gamma}{2}}{3} \geq \tan \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{6} \right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

ដូចនេះ $\tan \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \geq \sqrt{3}$

$$N_{14} : \cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2} + \cot \frac{\gamma}{2} \geq 3\sqrt{3}$$

យើងមាន $f(x) = \cot x$ ជាអនុគមន៍ផតលើ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\frac{\cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2} + \cot \frac{\gamma}{2}}{3} \geq \cot \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{6} \right) = \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$$

ដូចនេះ $\cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2} + \cot \frac{\gamma}{2} \geq 3\sqrt{3}$

$$N_{15} : \cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma \geq \sqrt{3}$$

យើងមាន $1 \geq \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$

និង $\cos \gamma = -\cos(\alpha + \beta) = -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$

បូកអង្គ និង អង្គយើងបាន $2 \sin \alpha \sin \beta \leq 1 + \cos \gamma$

$$\Rightarrow 2 \sin \alpha \sin \beta \sin(\alpha + \beta) \leq (1 + \cos \gamma) \sin(\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow 2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \leq (1 + \cos \gamma) \sin(\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow \frac{2 \sin \gamma}{1 + \cos \gamma} \leq \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

តើបាន $\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} + \frac{\cos \gamma}{\sin \gamma}$

$$\begin{aligned} &\geq \frac{2 \sin \gamma}{1 + \cos \gamma} + \frac{\cos \gamma}{\sin \gamma} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{4 \sin^2 \gamma + 2 \cos^2 \gamma + 2 \cos \gamma}{(1 + \cos \gamma) \sin \gamma} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3 \sin^2 \gamma + (1 + \cos \gamma)^2}{(1 + \cos \gamma) \sin \gamma} \right] \\ &\geq \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{3 \sin^2 \gamma (1 + \cos \gamma)^2}}{(1 + \cos \gamma) \sin \gamma} \right] = \sqrt{3} \end{aligned}$$

សំណើ

បើ α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមុំស្រួចមួយ គេបាន

$$N_{16} : \tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma \geq 3\sqrt{3} \quad 1$$

សម្រាយ

α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណស្រួច

គេបាន $\alpha, \beta, \gamma \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

ដោយ $f(x) = \tan x$ ជាអនុគមន៍ផ្គត់ផ្គង់លើ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

តាមវិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma}{3} \geq \tan \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{3} \right) = \tan \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$$

ហេតុនេះ $\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma \geq 3\sqrt{3}$

¹ ជាត្រីកោណដែលមានមុំទាំងបីជាមុំស្រួច

ទ្រឹស្តីបទ

បើ $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \pi)$ គេបាន α, β, γ ជាជួររង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ

$$\text{លុះត្រាតែ } \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1 \quad \text{។}$$

សម្រាយ

\Rightarrow បើ α, β, γ ជាជួររង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ នោះ $\alpha + \beta + \gamma = \pi$

$$\text{យើងបាន } \tan \frac{\gamma}{2} = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) = \cot \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} \right)$$

$$= \frac{\cot \frac{\alpha}{2} \cot \frac{\beta}{2} - 1}{\cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2}} = \frac{1 - \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2}}{\tan \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\beta}{2}}$$

$$\text{ហេតុនេះ } \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\Leftarrow \text{បើ } \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\text{បើ } \alpha = \beta = \gamma \text{ គេបាន } 3 \tan^2 \frac{\alpha}{2} = 1 \Rightarrow \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{ព្រោះ } \tan \frac{\alpha}{2} > 0$$

$$\text{នោះ } \alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \alpha + \beta + \gamma = \pi$$

យើងបាន α, β, γ ជាជួររង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ

WLOG សន្មតថា $\alpha \neq \beta$

$$\text{ដោយ } 0 < \alpha + \beta < 2\pi \Rightarrow \exists \gamma' \in (-\pi, \pi) : \alpha + \beta + \gamma' = \pi$$

$$\text{គេបាន } \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma'}{2} + \tan \frac{\gamma'}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\text{តែ } \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\beta}{2} + \tan \frac{\beta}{2} \tan \frac{\gamma}{2} + \tan \frac{\gamma}{2} \tan \frac{\alpha}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\gamma}{2} = \tan \frac{\gamma'}{2} \text{ នោះ } \left| \frac{\gamma - \gamma'}{2} \right| = k\pi \text{ ចំពោះ } k \in \mathbb{Z}^+$$

$$\text{ដោយ } \left| \frac{\gamma - \gamma'}{2} \right| \leq \frac{\gamma}{2} + \frac{\gamma'}{2} < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \Leftrightarrow k\pi < \pi \Rightarrow k = 0$$

យើងបាន $\gamma = \gamma'$ ពោល គឺ $\alpha + \beta + \gamma = \pi$

ហេតុនេះ α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ

របៀបចំនួនថែមត្រីកោណមាត្រ

បើបីចំនួនពិត x, y, z ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌមានទម្រង់ដូចសមភាពត្រី

កោណមាត្រណាមួយ ហើយមានដែនកំណត់ដូចអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនោះ

គេអាចជំនួសចំនួនទាំងនោះដោយអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។ ការជំនួសនេះមិន

ធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈទូទៅនោះទេ ហើយថែមទាំងធ្វើអោយវិសមភាពដែល

ស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយប្រែជាមានរាងងាយ ។

ហេតុនេះការចងចាំសមភាពត្រីកោណមាត្រពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បី
ឈានទៅដល់ការតាងបែបត្រីកោណមាត្រ ។

i. ចំពោះ $\sqrt{k-x^2}$ គេអាចតាង $x = \sqrt{k} \sin \alpha, \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

រឺ $x = \sqrt{k} \cos \alpha$ ចំពោះ $\alpha \in [0, \pi]$

ii. បើ $x^2 + y^2 = 1$ គេអាចតាង $x = \sin \alpha, y = \cos \alpha$

iii. បើ $x, y, z > 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $xy + yz + zx = 1$

គេអាចតាង $x = \tan \frac{\alpha}{2}$, $y = \tan \frac{\beta}{2}$, $z = \tan \frac{\gamma}{2}$ ដែល α, β, γ

ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ រឺ តាង $x = \cot \alpha$, $y = \cot \beta$, $z = \cot \gamma$ ដែល α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមុំស្រួចមួយ

iv. បើ $x, y, z > 0$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $x + y + z = xyz$

រឺ $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} = 1$ គេអាចតាង $x = \cot \frac{\alpha}{2}$, $y = \cot \frac{\beta}{2}$, $z = \cot \frac{\gamma}{2}$

ដែល α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ រឺ តាង $x = \tan \alpha$, $y = \tan \beta$, $z = \tan \gamma$ ដែល α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមុំស្រួចមួយ

v. បើ $x, y, z > 0$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$

គេអាចតាង $x = \sin \frac{\alpha}{2}$, $y = \sin \frac{\beta}{2}$, $z = \sin \frac{\gamma}{2}$ ដែល α, β, γ

ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ រឺ តាង $x = \cos \alpha$, $y = \cos \beta$, $z = \cos \gamma$ ដែល α, β, γ ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមុំស្រួចមួយ

vi. បើ $k + a^2 = k \left[1 + \left(\frac{a}{\sqrt{k}} \right)^2 \right]$ គេអាចតាង $a = \sqrt{k} \tan \alpha$

vii. បើមានរាង $\frac{2x}{1+x^2}$, $\frac{2x}{1-x^2}$, $\frac{1+x^2}{1-x^2}$ គេអាចតាង $x = \tan \alpha$

គេបាន $\frac{2x}{1+x^2} = \sin 2\alpha$, $\frac{2x}{1-x^2} = \tan 2\alpha$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} = \cos 2\alpha$

លំហាត់ ១

បើ $a, b, c \in (0,1)$ បង្ហាញថា $\sqrt{abc} + \sqrt{(1-a)(1-b)(1-c)} < 1$ (1) ។
(Romania, 2002)

បង្ហាញ

តាង $a = \cos^2 x, b = \cos^2 y, c = \cos^2 z$ ចំពោះ $x, y, z \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

យើងបាន (1) សមមូល $\cos x \cos y \cos z + \sin x \sin y \sin z < 1$ ពិត

ព្រោះ $\cos x \cos y \cos z + \sin x \sin y \sin z$
 $< \cos x \cos y + \sin x \sin y = \cos(x - y) \leq 1$

លំហាត់ ២

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $a + b + c = 1$ ។

បង្ហាញថា $a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{abc} \leq 1$ ។

សម្រាយ

យក $a = xy, b = yz$ និង $c = zx$ យើងបាន

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{abc} \leq 1 \Leftrightarrow x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2 + 2\sqrt{3}xyz \leq 1$$

ដែល x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $xy + yz + zx = 1$ (*)

យើងមាន $x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2 + 2\sqrt{3}xyz \leq 1$

$$\Leftrightarrow (xy + yz + zx)^2 + 2\sqrt{3}xyz \leq 1 + 2xyz(x + y + z)$$

$$\Leftrightarrow x + y + z \geq \sqrt{3} \quad (1)$$

តាម (*) យើងយក $x = \tan \frac{A}{2}, y = \tan \frac{B}{2}, z = \tan \frac{C}{2}$

ដែល A, B, C ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ

យើងបាន (1) $\Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \geq \sqrt{3}$ ពិត តាម N_{13}

លំហាត់ ៣

គេឲ្យ $a, b, c \in (0,1)$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $ab + bc + ca = 1$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a}{1-a^2} + \frac{b}{1-b^2} + \frac{c}{1-c^2} \geq \frac{3}{4} \left(\frac{1-a^2}{a} + \frac{1-b^2}{b} + \frac{1-c^2}{c} \right)$ ។

ចម្លើយ

ដោយ $a, b, c \in (0,1)$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $ab + bc + ca = 1$

យក $a = \tan \frac{A}{2}, b = \tan \frac{B}{2}, c = \tan \frac{C}{2}$ ដែល A, B, C ជារង្វាស់មុំនៃ

ត្រីកោណមុំស្រួច

យើងបាន $\frac{a}{1-a^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2 \tan \frac{A}{2}}{1 - \tan^2 \frac{A}{2}} \right) = \frac{\tan A}{2}$

ដូចគ្នាដែរ $\frac{b}{1-b^2} = \frac{\tan B}{2}, \frac{c}{1-c^2} = \frac{\tan C}{2}$

គេបាន $\frac{a}{1-a^2} + \frac{b}{1-b^2} + \frac{c}{1-c^2} \geq \frac{3}{4} \left(\frac{1-a^2}{a} + \frac{1-b^2}{b} + \frac{1-c^2}{c} \right)$

$\Leftrightarrow \tan A + \tan B + \tan C \geq 3 \left(\frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C} \right) (*)$

តាម $I_7 : \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$

យើងបាន (*) សមមូល

$$(\tan A + \tan B + \tan C)^2 \geq 3(\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} [(\tan A - \tan B)^2 + (\tan B - \tan C)^2 + (\tan C - \tan A)^2] \geq 0 \text{ ពិត}$$

លំហាត់ ៤

តើឲ្យ $x, y, z > 0$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{x}{x + \sqrt{(x+y)(x+z)}} + \frac{y}{y + \sqrt{(y+z)(y+x)}} + \frac{z}{z + \sqrt{(z+x)(z+y)}} \leq 1 \quad (*)$$

ចម្លើយ

យើងមាន

$$\frac{x}{x + \sqrt{(x+y)(x+z)}} + \frac{y}{y + \sqrt{(y+z)(y+x)}} + \frac{z}{z + \sqrt{(z+x)(z+y)}} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{(x+y)(x+z)}{x^2}}} + \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{(y+z)(y+x)}{y^2}}} + \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{(z+x)(z+y)}{z^2}}} \leq 1$$

ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន WLOG សន្មតថា $xy + yz + zx = 1$

យក $x = \tan \frac{A}{2}$, $y = \tan \frac{B}{2}$, $z = \tan \frac{C}{2}$ ដែល A, B, C ជារង្វាស់មុំនៃ

ត្រីកោណមួយ

យើងបាន

$$\frac{(x+y)(x+z)}{x^2} = \frac{\left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}\right)\left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2}\right)}{\tan^2 \frac{A}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sin^2 \frac{A}{2}}$$

ដូចគ្នាដែរ គេបាន $\frac{(y+z)(y+x)}{y^2} = \frac{1}{\sin^2 \frac{B}{2}}$

យើងបាន (*) សមមូល $\frac{\sin \frac{A}{2}}{1 + \sin \frac{A}{2}} + \frac{\sin \frac{B}{2}}{1 + \sin \frac{B}{2}} + \frac{\sin \frac{C}{2}}{1 + \sin \frac{C}{2}} \leq 1$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + \sin \frac{A}{2}} + \frac{1}{1 + \sin \frac{B}{2}} + \frac{1}{1 + \sin \frac{C}{2}} \geq 2 \text{ ពិត}$$

ព្រោះ តាម AM-HM គេបាន $\frac{1}{1 + \sin \frac{A}{2}} + \frac{1}{1 + \sin \frac{B}{2}} + \frac{1}{1 + \sin \frac{C}{2}}$

$$\geq \frac{9}{3 + \sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2}}$$

$$\geq \frac{9}{3 + \frac{3}{2}} = 2$$

តាម $N_3 : \sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \leq \frac{3}{2}$

លំហាត់ ៥

គេឲ្យ $x, y, z > 0$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $x + y + z = xyz$ ។

បង្ហាញថា

$$\text{ក/ } \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2} \quad (1)$$

$$\text{ខ/ } \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad (2) \text{។}$$

បញ្ជីយ

ក/

ដោយ $x, y, z > 0$ បំពេញលក្ខខណ្ឌ $x + y + z = xyz$

តាង $x = \tan A, y = \tan B, z = \tan C$

ដែល A, B, C ជារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមុំស្រួច

យើងបាន $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 A}} = \cos A$

ដូចគ្នាដែរ $\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 B}} = \cos B, \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 C}} = \cos C$

គេបាន (1) $\Leftrightarrow \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ ពិត តាម N_5

ហេតុនេះ $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2}$

ខ/ ដូចគ្នាដែរ (2) $\Leftrightarrow \sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ពិត តាម N_1

ហេតុនេះ $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$

លំហាត់ ៦

គេឲ្យ $a, b, c, d > 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{1}{1+a^4} + \frac{1}{1+b^4} + \frac{1}{1+c^4} + \frac{1}{1+d^4} = 1$ ។

បង្ហាញថា $abcd \geq 3$ ។

(Latvia, 2002)

ចម្លើយ

តាង $a^2 = \tan A, b^2 = \tan B, c^2 = \tan C$ និង $d^2 = \tan D$

ចំពោះ $A, B, C, D \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

គេបាន $\frac{1}{1+a^4} + \frac{1}{1+b^4} + \frac{1}{1+c^4} + \frac{1}{1+d^4} = 1$

$$\Leftrightarrow \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C + \cos^2 D = 1$$

តាម AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} \sin^2 A &= 1 - \cos^2 A = \cos^2 B + \cos^2 C + \cos^2 D \\ &\geq 3\sqrt{(\cos B \cos C \cos D)^2} \end{aligned} \tag{1}$$

$$\text{ដូចគ្នាដែរ គេបាន } \sin^2 B \geq 3\sqrt{(\cos C \cos D \cos A)^2} \tag{2}$$

$$\sin^2 C \geq 3\sqrt{(\cos D \cos A \cos B)^2} \tag{3}$$

$$\sin^2 D \geq 3\sqrt{(\cos A \cos B \cos C)^2} \tag{4}$$

គុណអង្គ និង អង្គនៃ (1), (2), (3), (4)

គេបាន $\sin^2 A \sin^2 B \sin^2 C \sin^2 D \geq 3^4 \cos^2 A \cos^2 B \cos^2 C \cos^2 D$

$$\Rightarrow \tan^2 A \tan^2 B \tan^2 C \tan^2 D \geq 3^4$$

$$\Rightarrow (abcd)^4 \geq 3^4$$

ហេតុនេះ $abcd \geq 3$

សំណួរ ៧

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$$a^2 + b^2 + c^2 + abc = 4 \text{ ។ បង្ហាញថា } 0 \leq ab + bc + ca - abc \leq 2 \text{ ។}$$

(USA,2001)

ចម្លើយ

$$\text{បើ } a, b, c > 1 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + abc > 4$$

ហេតុនេះ ដើម្បីឲ្យ $a^2 + b^2 + c^2 + abc = 4$ លុះត្រាតែមានយ៉ាងហោចណាស់មួយចំនួនតូចជាង 1 រឺ ស្មើនឹង 1

$$\text{ដោយ } a^2 + b^2 + c^2 + abc = 4 \text{ ស៊ីមេទ្រីជៀបនឹង } a, b, c$$

WLOG ឧបមថា $a \leq 1$

$$\text{គេបាន } ab + bc + ca - abc \geq (1-a)bc \geq 0 \quad (1)$$

$$\text{យក } a = 2p, b = 2q, c = 2r$$

$$\text{គេបាន } a^2 + b^2 + c^2 + abc = 4 \Leftrightarrow p^2 + q^2 + r^2 + 2pqr = 1 \quad (*)$$

$$\text{តាម } (*) \text{ គេបាន } p = \cos A, q = \cos B, r = \cos C$$

$$\text{រឺ } a = 2 \cos A, b = 2 \cos B, c = 2 \cos C \text{ ចំពោះ } A, B, C \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$$

ជាង្វាស់មុំនៃត្រីកោណមួយ

$$\text{យើងបាន } ab + bc + ca - abc \leq 2$$

$$\Leftrightarrow \cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A - 2 \cos A \cos B \cos C \leq \frac{1}{2}$$

យើងមាន $1 - 2 \cos A \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A - 2 \cos A \cos B \cos C \\ = \cos A(\cos B + \cos C) + \cos B \cos C(1 - 2 \cos A) \end{aligned}$$

$$\text{ដោយ } \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2} - \cos A$$

$$\text{ហើយ } \cos B \cos C = \frac{1}{2} [\cos(B - C) + \cos(B + C)] \leq \frac{1 - \cos A}{2}$$

យើងបាន

$$\begin{aligned} \cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A - 2 \cos A \cos B \cos C \\ \leq \cos A \left(\frac{3}{2} - \cos A \right) + \left(\frac{1 - \cos A}{2} \right) (1 - 2 \cos A) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{នោះ } ab + bc + ca - abc \leq 2 \quad (2)$$

តាម (1), (2) យើងបាន $0 \leq ab + bc + ca - abc \leq 2$

លំហាត់ ៨

គេឲ្យ a, b, c បំពេញលក្ខខណ្ឌ $a + b + c = 1$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{\sqrt{abc}}{c+ab} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4} \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

យក $a = xy, b = yz$ និង $c = zx$ ដែល $x, y, z > 0$

$$\text{យើងបាន } \frac{a}{a+bc} + \frac{b}{b+ca} + \frac{\sqrt{abc}}{c+ab} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{xy}{xy + (yz)(zx)} + \frac{yz}{yz + (zx)(xy)} + \frac{xyz}{zx + (xy)(yz)} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1+x^2} + \frac{y}{1+y^2} + \frac{1}{1+z^2} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4} \quad (**)$$

ដែល $xy + yz + zx = 1$

តាង $x = \tan \frac{A}{2}$, $y = \tan \frac{B}{2}$, $z = \tan \frac{C}{2}$ ដែល A, B, C ជាជ្រុងសមុំនៃ

ត្រីកោណមួយ

ហេតុនេះ: (**)

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{A}{2}} + \frac{\tan \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} + \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{C}{2}} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 \frac{A}{2} + \frac{1}{2} \sin B + \cos^2 \frac{C}{2} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 + \cos A}{2} + \frac{1 + \cos C}{2} + \frac{\sin B}{2} \leq 1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\Leftrightarrow \cos A + \sin B + \cos C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad \text{ពិត}$$

ព្រោះ: $\cos A + \sin B + \cos C = \cos A + \cos C + \sin[\pi - (A + C)]$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos A + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos C \right)$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{3}} (\sqrt{3} \sin A \cos C + \sqrt{3} \cos A \sin C)$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} + \cos^2 A + \frac{3}{4} + \cos^2 C \right)$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2\sqrt{3}}(3\sin^2 A + \cos^2 C + \cos^2 A + 3\sin^2 C) \\
 & = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}(\cos^2 A + \sin^2 A) + \frac{\sqrt{3}}{2}(\cos^2 B + \sin^2 B) = \frac{3\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

លំហាត់ ៩

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq 9(ab + bc + ca) \quad \forall$$

ចម្លើយ

តាង $a = \sqrt{2} \tan A, b = \sqrt{2} \tan B$ និង $c = \sqrt{2} \tan C$

$$\text{ដែល } A, B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

យើងបាន $(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq 9(ab + bc + ca)$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{\cos^2 A \cos^2 B \cos^2 C} \geq 9(2 \tan A \tan B + 2 \tan B \tan C + 2 \tan C \tan A)$$

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow \cos A \cos B \cos C (\cos A \sin B \sin C + \sin A \cos B \sin C \\
 + \sin A \sin B \cos C) \leq \frac{4}{9} \quad (*)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ដោយ } \cos(A + B + C) &= \cos A \cos B \cos C - \cos A \sin B \sin C \\
 &\quad - \sin A \cos B \sin C - \sin A \sin B \cos C
 \end{aligned}$$

$$(*) \Leftrightarrow \cos A \cos B \cos C [\cos A \cos B \cos C - \cos(A + B + C)] \leq \frac{4}{9}$$

តាង $\theta = \frac{A + B + C}{3}$ ដោយ $\cos A, \cos B, \cos C > 0$

និង $f(x) = \cos x$ ជាអនុគមន៍ចំនុចលើ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

តាម AM-GM និង វិសមភាព Jensen យើងបាន

$$\cos A \cos B \cos C \leq \left(\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \right)^3 \leq \cos^3 \theta$$

បង្ហាញថា $\cos^3 \theta (\cos^3 \theta - \cos 3\theta) \leq \frac{4}{9}$

ដោយ $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$

$$\Rightarrow \cos^3 \theta - \cos 3\theta = 3\cos \theta - 3\cos^3 \theta$$

គេបាន $\cos^3 \theta (\cos^3 \theta - \cos 3\theta) \leq \frac{4}{9} \Leftrightarrow \cos^4 \theta (1 - \cos^2 \theta) \leq \frac{4}{27}$ ពិត

ព្រោះ តាម AM-GM យើងបាន

$$\begin{aligned} \cos^4 \theta (1 - \cos^2 \theta) &= \left[\frac{\cos^2 \theta}{2} \cdot \frac{\cos^2 \theta}{2} (1 - \cos^2 \theta) \right]^{\frac{1}{3}} \\ &\leq \frac{1}{3} \left[\frac{\cos^2 \theta}{2} + \frac{\cos^2 \theta}{2} + (1 - \cos^2 \theta) \right] = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

សមភាពលុះត្រាតែ $\tan A = \tan B = \tan C = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow a = b = c = 1$

លំហាត់ ១០

គេឲ្យ $x, y, z > 1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$ ។

បង្ហាញថា $\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$ ។

(Iran 1998)

ចម្លើយ

តាង $a = \sqrt{x-1}$, $b = \sqrt{y-1}$ និង $c = \sqrt{z-1}$

$$\text{គេបាន } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \Leftrightarrow a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2a^2b^2c^2 = 1$$

យក $p = ab$, $q = bc$, $r = ca$ នោះ $p^2 + q^2 + r^2 + 2pqr = 1$

តាង $p = \cos A$, $q = \cos B$, $r = \cos C$ ដែល A, B, C ជាមុំនៃត្រីកោណមុំស្រួចមួយ

$$\text{យើងបាន } \sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 3} \geq a + b + c$$

$$\Leftrightarrow p + q + r \leq \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2} \text{ ពិត}$$

$$\text{ហេតុនេះ } \sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$$

លំហាត់ ១១

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញដែល $xy + yz + zx = 1$ ។ បង្ហាញថា

$$x(1-y^2)(1-z^2) + y(1-z^2)(1-x^2) + z(1-x^2)(1-y^2) \leq \frac{4\sqrt{3}}{9} \quad (1) \quad \text{។}$$

(Hong Kong, 1994)

ចម្លើយ

ដោយ $x, y, z > 0$ ដែល $xy + yz + zx = 1$

តាង $x = \tan \frac{A}{2}$, $y = \tan \frac{B}{2}$, $z = \tan \frac{C}{2}$ ដែល A, B, C ជាមុំនៃ

ត្រីកោណមួយ

យើងបាន $x(1-y^2)(1-z^2) = \tan \frac{A}{2} \left(1 - \tan^2 \frac{B}{2}\right) \left(1 - \tan^2 \frac{C}{2}\right)$

តាម $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \Rightarrow 1 - \tan^2 \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{\tan 2\alpha}$

គេបាន $x(1-y^2)(1-z^2) = 4 \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \left(\frac{1}{\tan B \tan C}\right)$

ដូចគ្នាដែរ $y(1-z^2)(1-x^2) = 4 \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \left(\frac{1}{\tan C \tan A}\right)$

$$z(1-x^2)(1-y^2) = 4 \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \left(\frac{1}{\tan A \tan B}\right)$$

នោះ (1) សមមូល $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \left(\frac{\tan A + \tan B + \tan C}{\tan A \tan B \tan C}\right) \leq \frac{\sqrt{3}}{9}$ (2)

ដោយ $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$

(A, B, C ជាជួរសមុំនៃត្រីកោណមួយ)

ហេតុនេះ (2) សមមូល $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \leq \frac{\sqrt{3}}{9}$ ពិត

ព្រោះ តាម AM-GM យើងបាន $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}$
 $\geq 3\sqrt{\left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}\right)^2}$

ដោយ $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1$


ដូចនេះ $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} \leq \frac{\sqrt{3}}{9}$

iii. **ការជំនួសបែប Ravi** (Ravi Transformation)

ការជំនួសបែប Ravi គឺជាការជំនួសដើម្បីបំប្លែងពីវិសមភាពនៃជ្រុងត្រីកោណឲ្យទៅជាវិសមភាពនៃចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។

សង្កេតលើរង្វង់ (I, r) ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABC ដែលរង្វង់នេះប៉ះទៅនឹងជ្រុង BC, CA និង AB ត្រង់ X, Y និង Z រៀងគ្នា ។

យក $x = AZ = YA, y = ZB = BX, z = XC = CY$



តាមរូបយើងបាន $a = y + z, b = z + x, c = x + y, x = s - a,$

$$y = s - b \text{ និង } z = s - c \text{ ដែល } s = \frac{a + b + c}{2}$$

សរុបមក បើ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ $\Rightarrow \exists x, y, z > 0$

បំពេញលក្ខខណ្ឌ $a = x + y, b = z + x$ និង $c = x + y$ ។

លំហាត់ ១

បើ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$(b + c - a)(c + a - b)(a + b - c) \leq abc \quad (*)$$

ចម្លើយ

យក $a = x + y$, $b = z + x$ និង $c = x + y$ ចំពោះ $x, y, z > 0$

យើងបាន $(b + c - a)(c + a - b)(a + b - c) = 8xyz$

និង $abc = (x + y)(y + z)(z + x)$

(*) $\Leftrightarrow 8xyz \leq (x + y)(y + z)(z + x)$ ពិតតាម AM-GM

លំហាត់ ២

គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \quad (*)$$

(APMO, 1996)

ចម្លើយ

យក $a = x + y$, $b = z + x$ និង $c = x + y$ ចំពោះ $x, y, z > 0$

(*) $\Leftrightarrow \sqrt{2x} + \sqrt{2y} + \sqrt{2z} \leq \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{z+x}$ ពិត

ព្រោះ តាម QM-AM យើងបាន $\sqrt{2x} + \sqrt{2y} + \sqrt{2z}$

$$= \frac{\sqrt{2x} + \sqrt{2y}}{2} + \frac{\sqrt{2y} + \sqrt{2z}}{2} + \frac{\sqrt{2z} + \sqrt{2x}}{2}$$

$$\leq \sqrt{\frac{2x+2y}{2}} + \sqrt{\frac{2y+2z}{2}} + \sqrt{\frac{2z+2x}{2}}$$

$$= \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{z+x}$$

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ $x = y = z \Leftrightarrow a = b = c$

មិនត្រឹមតែរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងអាចសរសេរជា
អនុគមន៍នៃ $x, y, z > 0$ តែយើងក៏អាចសរសេរឲ្យជាប់អនុគមន៍ $x, y,$

$z > 0$ ផងដែរនូវ ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ កាំរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ កាំរង្វង់ចារឹក ក្រៅត្រីកោណ និង កន្លះបរិមាត្រ ។

ដោយ $a = x + y$, $b = z + x$ និង $c = x + y$

យើងបាន $s = \frac{a + b + c}{2} = x + y + z$

តាមរូបមន្តហេរុង (Heron's formula)

$$(ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{(x+y+z)xyz}$$

តាមរូបមន្តក្រឡាផ្ទៃ $(ABC) = sr \Rightarrow r = \frac{(ABC)}{s} = \sqrt{\frac{xyz}{x+y+z}}$

ហើយ តាម $(ABC) = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{4\sqrt{(x+y+z)xyz}}$

លំហាត់ ៣

គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ ABC ។ បើគេសង់ត្រីកោណ

$A'B'C'$ មួយទៀតដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a + \frac{b}{2}, b + \frac{c}{2}, c + \frac{d}{2}$ ។

បង្ហាញថា $(A'B'C') \geq \frac{9}{4}(ABC)$ ។

(India, 2003)

ចម្លើយ

យក $a = x + y$, $b = z + x$ និង $c = x + y$

យើងបានរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ $A'B'C'$ ត្រូវបានសម្តែងដោយ

$$a' = \frac{x + 2y + 3z}{2}, b' = \frac{3x + y + 2z}{2}, c' = \frac{2x + 3y + z}{2}$$

$$\text{យើងបាន } (A'B'C') = \sqrt{\frac{3(x + y + z)(2x + y)(2y + z)(2z + x)}{16}}$$

$$\text{តាម AM-GM យើងបាន } 2x + y \geq 3\sqrt{x^2 y}, 2y + z \geq 3\sqrt{y^2 z}$$

$$\text{និង } 2z + x \geq 3\sqrt{z^2 x}$$

$$\text{គេបាន } (A'B'C') \geq \sqrt{\frac{3(x + y + z)27xyz}{16}} = \frac{9}{4}(ABC)$$



លំហាត់

1. គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{x^3}{x^3 + 2y^3} + \frac{y^3}{y^3 + 2z^3} + \frac{z^3}{z^3 + 2x^3} \geq 1 \text{ ។}$$

2. យក x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $xyz = 1$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{1}{yz + z} + \frac{1}{zx + x} + \frac{1}{xy + y} \geq \frac{3}{2} \text{ ។}$$

(Kazakhstan, 2008)

3. បើ $n > 3$ និង x_1, x_2, \dots, x_n ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $x_1 x_2 \dots x_n = 1$ ។ បង្ហាញថា

$$\frac{1}{1 + x_1 + x_1 x_2} + \frac{1}{1 + x_2 + x_2 x_3} + \dots + \frac{1}{1 + x_n + x_n x_1} > 1 \text{ ។}$$

(Russia, 2004)

4. a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $ab + bc + ca = abc$ ។

បង្ហាញថា
$$\frac{a^4 + b^4}{ab(a^3 + b^3)} + \frac{b^4 + c^4}{bc(b^3 + c^3)} + \frac{c^4 + a^4}{ca(c^3 + a^3)} \geq 1 \text{ ។}$$

(Poland, 2006)

5. ចំពោះ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន បង្ហាញថា

$$\frac{1}{3} \left(\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \right) \geq \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}} \geq \frac{a + b + c}{3} \text{ ។}$$

(Ireland, 2007)

6. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ $abc = 8$ ។

បង្ហាញថា $\frac{a-2}{a+1} + \frac{b-2}{b+1} + \frac{c-2}{c+1} \leq 0$ ។

7. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

ក/ $3(ab + bc + ca) \leq (a + b + c)^2 < 4(ab + bc + ca)$

ខ/ $ab + bc + ca \leq a^2 + b^2 + c^2 \leq 2(ab + bc + ca)$

គ/ $\frac{3}{2} \leq \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2$ ។

8. យក a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) \leq 3abc$ ។

(IMO,1964)

9. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$a(b^2 + c^2 - a^2) + b(c^2 + a^2 - b^2) + c(a^2 + b^2 - c^2) \leq 3abc$ ។

10. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$a^2b(a-b) + b^2c(b-c) + c^2a(c-a) \geq 0$ ។

(IMO,1983)

11. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ។ បង្ហាញថា

$\left| \frac{a-b}{a+b} + \frac{b-c}{b+c} + \frac{c-a}{c+a} \right| < \frac{1}{8}$ ។

12. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយបំពេញលក្ខខណ្ឌ

$ab + bc + ca = 3$ ។ បង្ហាញថា $3 \leq a + b + c \leq 2\sqrt{3}$ ។

13. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ហើយ r ជាកាំរង្វង់

ចារឹកក្នុងត្រីកោណនោះ ។ បង្ហាញថា $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{\sqrt{3}}{2r}$ ។

14. គេឲ្យ a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណមួយ ហើយ s ជាកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ។ បង្ហាញថា

$$\text{ក/ } (s-a)(s-b) < ab$$

$$\text{ខ/ } (s-a)(s-b) + (s-b)(s-c) + (s-c)(s-a)$$

$$\leq \frac{ab+bc+ca}{4} \text{ ។}$$

15. យក a, b, c ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណស្រួចមួយ ។ បង្ហាញថា

$$\sum_{cyc} \sqrt{a^2+b^2-c^2} \sqrt{a^2-b^2+c^2} \leq a^2+b^2+c^2 \text{ ។}$$



ភាពអូម៉ូសែន
(The Homogeneity)

និយមន័យ

គេថា អនុគមន៍ $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ជាអនុគមន៍អូម៉ូសែន (homogenous) បើចំពោះ $t \in \mathbb{R} - \{1\}$ គេបាន $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ។

ឧទាហរណ៍ $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2x + y}$ ជាអនុគមន៍អូម៉ូសែន ព្រោះ

$$f(tx, ty) = \frac{t^2x^2 + t^2y^2}{2tx + ty} = tf(x, y)$$

ចំណែក $f(x, y, z) = x^2 + xy + 3z$ មិនមែនជាអនុគមន៍អូម៉ូសែនទេ ។

សម្គាល់ $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ហៅថាវិសមភាពអូម៉ូសែន បើ $h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ជាអនុគមន៍អូម៉ូសែន វិ អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា តួនីមួយៗនៃ $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ និង $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ មានដីក្រេស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍

$x^2 + y^2 + 2xy \geq z^2 + yz$ ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន ព្រោះ តួនីមួយៗនៃ $x^2 + y^2 + 2xy$ និង $z^2 + yz$ មានដីក្រេ 2 ដូចគ្នា។

ដូចគ្នាដែរ $a^2b + b^2a \leq a^3 + b^3$ ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន ។

ចំណែកឯ $b^5 + 1 \geq 5ab(1 - ab)$ មិនមែនជាវិសមភាពអូម៉ូសែនទេ ។

បើវិសមភាពមួយជាវិសមភាពអូម៉ូសែន នោះគេអាចបង្កើតលក្ខខណ្ឌបន្ថែម។

លក្ខខណ្ឌបន្ថែមនេះមិនបានធ្វើឲ្យវិសមភាពបាត់បង់លក្ខណៈទូទៅទេ ។

លើសពីនេះទៅ ទៀតការបង្កើតលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះអាចជួយឲ្យវិសមភាពមាន

ទម្រង់ងាយជាងមុន ។ ដំណើរការនៃការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌ និង ធ្វើឲ្យវិសមភាព

មានទម្រង់ងាយជាងមុននេះ ត្រូវបានហៅថា Normalization ។

ចំពោះវិសមភាពនៃបីអថេរ a, b, c អាចត្រូវបាន Normalized (បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ) ផ្សេងៗដូចជា $a + b + c = 1$ រឺ $abc = 1$ រឺ $ab + bc + ca = 1 \dots$ ។

របៀប Normalization ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមលំហាត់នីមួយៗ ពេល គឺ

ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំហាត់វិសមភាពដែលត្រូវដោះស្រាយមានទម្រង់ងាយ (ស្រួល

ស្រាយបញ្ជាក់) ។

សង្កេតវិសមភាព $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន

យើងអាច Normalize ដោយយក $abc = 1$ ព្រោះ បើគេយក $abc = k^3$

និង $a = kx, b = ky, c = kz \Rightarrow xyz = 1$

យើងបាន $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$$

មានន័យថា បើ $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$ ចំពោះ $xyz = 1$

គេបាន $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

លំហាត់ ១

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \sqrt[3]{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{8}} \quad \text{។}$$

ចម្លើយ

WLOG សន្មតថា $ab+bc+ca = 3$

តាម AM-GM យើងបាន $a+b+c \geq 3$ និង $abc \leq 1$

$$\begin{aligned} \text{នោះ } (a+b)(b+c)(c+a) &= (a+b+c)(ab+bc+ca) - abc \\ &= 3(a+b+c) - abc \geq 8 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} = 1 \leq \sqrt[3]{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{8}}$$

$$\text{ដូចនេះ } \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \sqrt[3]{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{8}} \quad (*)$$

ពន្យល់បន្ថែម

ហេតុអ្វីបានជាយើងអាចបន្ថែមនូវលក្ខខណ្ឌ $ab+bc+ca = 3$?

ព្រោះ បើ $a=b=c=0$ គេបាន (*) ពិត

$$\text{ផ្ទុយពីនេះ តាង } a' = \frac{a}{t}, b' = \frac{b}{t} \text{ និង } c' = \frac{c}{t} \quad (t > 0)$$

យើងបាន (*) ពិតចំពោះគ្រប់ a, b, c លុះត្រាតែ (*) ពិតចំពោះគ្រប់ $a',$

$$b', c' \text{ បើយើងយក } t = \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \Rightarrow a'b'+b'c'+c'a' = 3$$

តាមសម្រាយខាងលើ (*) ពិតចំពោះគ្រប់ a', b', c'

ហេតុនេះ (*) ក៏ពិតចំពោះគ្រប់ a, b, c ដែរ ។

លំហាត់ ២

ចំពោះ $a, b, c > 0$ បង្ហាញថា $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ ។

ចម្លើយ

ដោយ $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ ជាវិសមភាពអូម៉ូសែន

WLOG សន្មតថា $a+b+c=1$

យើងបាន $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{2}$ ពិត

ព្រោះ តាម AM-HM គេបាន $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{2(a+b+c)} = \frac{9}{2}$

ដូចនេះ $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$

លំហាត់ ៣

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{(2a+b+c)^2}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{(2b+c+a)^2}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{(2c+a+b)^2}{2c^2+(a+b)^2} \leq 8 \text{ ។}$$

(USA,2003)

ចម្លើយ

WLOG ឧបមាថា $a+b+c=3$

$$\text{យើងបាន } \frac{(2a+b+c)^2}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{(2b+c+a)^2}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{(2c+a+b)^2}{2c^2+(a+b)^2}$$

$$= \frac{(3+a)^2}{2a^2+(3-a)^2} + \frac{(3+b)^2}{2b^2+(3-b)^2} + \frac{(3+c)^2}{2c^2+(3-c)^2}$$

ដោយ $\frac{3(3+a)^2}{2a^2+(3-a)^2} = \frac{a^2+6a+9}{a^2-2a+3} = 1 + \frac{8a+6}{(a-1)^2+2}$

$$\leq 1 + \frac{8a+6}{2} = 4a+4$$

គេបាន $\sum_{cyc} \frac{(3+a)^2}{2a^2+(3-a)^2} \leq \frac{1}{3} \left(12 + 4 \sum_{cyc} a \right) = 8$

លំហាត់ ៤

គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2+a^2} + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2+b^2} + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2+c^2} \geq \frac{3}{5} \quad \text{។}$$

(Japan, 2002)

ចម្លើយ

WLOG សន្មតថា $a+b+c=3$

យើងបាន $\frac{(b+c-a)^2}{(b+c)^2+a^2} + \frac{(c+a-b)^2}{(c+a)^2+b^2} + \frac{(a+b-c)^2}{(a+b)^2+c^2} \geq \frac{3}{5}$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} \frac{(3-2a)^2}{a^2+(3-a)^2} \geq \frac{3}{5}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{cyc} \frac{1}{2a^2-6a+9} \leq \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{ដោយ } \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{5}{2a^2 - 6a + 9} - 1 \right) &= \sum_{\text{cyc}} \frac{2(a-1)(a-2)}{2a^2 - 6a + 9} \\ &= \sum_{\text{cyc}} \left[\frac{-2(a-1)}{5} + \frac{(a-1)^2(2a+1)}{5(2a^2 - 6a + 9)} \right] \geq \sum_{\text{cyc}} \frac{-2(a-1)}{5} = 0 \end{aligned}$$

សម្រាប់វិសមភាពភ្ជាប់មកជាមួយនូវលក្ខខណ្ឌវិញ គេក៏អាចបំលែងវិសមភាពនោះឲ្យទៅជាវិសមភាពអូម៉ូសែនដែរ ដោយប្រើការតាងមួយចំនួនដូចជា

បើ $abc = 1$ គេតាង $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$

បើ $a + b + c = 1$ គេតាង $a = \frac{x}{x + y + z}, b = \frac{y}{x + y + z}$ និង

$$c = \frac{z}{x + y + z}$$

បើ $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ គេតាង $a = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, b = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

និង $c = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

បន្ទាប់ពី អូម៉ូសែន¹ ហើយ យើងអាច Normalize វិសមភាពទាំងនោះឲ្យមានទម្រង់ងាយ ។

លំហាត់ ៥

គេឲ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានបំពេញលក្ខខណ្ឌ $x + y + z = 1$ ។

¹ អូម៉ូសែន គឺជាការបំលែងវិសមភាពមួយឲ្យក្លាយជាវិសមភាពអូម៉ូសែនដោយប្រើលក្ខខណ្ឌដែលគេឲ្យ ។

បង្ហាញថា $xy + yz + zx \geq 9xyz$ ។

ចម្លើយ

យើងអាចអ្នកម៉ូសែនវិសមភាពនេះតាមលក្ខខណ្ឌ $x + y + z = 1$

តាង $x = \frac{a}{a+b+c}$, $y = \frac{b}{a+b+c}$, $z = \frac{c}{a+b+c}$

យើងបាន $xy + yz + zx \geq 9xyz$

$$\Leftrightarrow \frac{ab}{(a+b+c)^2} + \frac{bc}{(a+b+c)^2} + \frac{ca}{(a+b+c)^2} \geq \frac{9abc}{(a+b+c)^3}$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 9abc \quad (*)$$

(*) ជាវិសមភាពអ្នកម៉ូសែន សន្មតថា $abc = 1$

(*) សមមូល $(ab+bc+ca)(a+b+c) \geq 9$ ពិត

ព្រោះ តាម AM-GM យើងមាន $(ab+bc+ca)(a+b+c)$

$$\begin{aligned} &= a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2b + c^2a + 3abc \\ &= \frac{a}{c} + \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 3 \geq 6 + 3 = 9 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $xy + yz + zx \geq 9xyz$



លំហាត់

1. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{(2a+b+c)^3}{4a^3+(b+c)^3} + \frac{(2b+c+a)^3}{4b^3+(c+a)^3} + \frac{(2c+a+b)^3}{4c^3+(a+b)^3} \leq \frac{12}{a+b+c} \text{ ។}$$

2. គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b^2+c^2+d^2} + \frac{b}{c^2+d^2+a^2} + \frac{c}{d^2+a^2+b^2} + \frac{d}{a^2+b^2+c^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}} \text{ ។}$$

3. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + \frac{3\sqrt{abc}}{2(a+b+c)} \geq 2 \text{ ។}$$

4. គេឲ្យ a, b, c, d ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{abc}{(d+a)(d+b)(d+c)} + \frac{bcd}{(a+b)(a+c)(a+d)} + \frac{cda}{(b+a)(b+c)(b+d)} + \frac{dab}{(c+a)(c+b)(c+d)} \geq \frac{1}{2} \text{ ។}$$

5. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\text{ក/ } \sqrt{\frac{2a^2+bc}{a^2+2bc}} + \sqrt{\frac{2b^2+ca}{b^2+2ca}} + \sqrt{\frac{2c^2+ab}{c^2+2ab}} \geq 2\sqrt{2}$$

$$\text{ខ/ } \sqrt{\frac{a^2+2bc}{2a^2+bc}} + \sqrt{\frac{b^2+2ca}{2b^2+ca}} + \sqrt{\frac{c^2+2ab}{2c^2+ab}} \geq 2\sqrt{2} \text{ ។}$$

6. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{ab}{a+4b+4c} + \frac{bc}{b+4c+4a} + \frac{ca}{c+4a+4b} \leq \frac{a+b+c}{9} \text{ ។}$$

7. គេឲ្យ a_i ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានចំពោះ $i = \overline{1, n}$ ។ បង្ហាញថា

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \text{ ។}$$

8. គេឲ្យ a, b, c ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ បង្ហាញថា

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + \frac{abc}{2(a^3+b^3+c^3)} \geq \frac{5}{3} \text{ ។}$$



